



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ  
REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 24.09.2014 № 3817-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 01.10.2014 р. № 2851 зареєстровано:

препарат Альтрезин

форма Розчин для перорального застосування

Власник реєстраційного посвідчення:

*Сева Санте Анімаль*

*10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібуρν, Франція*

зареєстровано в Україні за № AA-05480-01-14 від 01.10.2014

Виробник:

*Сева Санте Анімаль*

*З.І. Тре ле Буа*

*22600 Лудеак, Франція*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2)
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до 30.09.2019

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату

Заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України  
Заступник Головного державного інспектора ветеринарної медицини України  
Deputy Chief of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine  
Deputy Chief State Inspector of Veterinary Medicine of Ukraine



**В.В. Башинський**

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Альтрезин

### 2. Склад

100 мл препарату містять діючу речовину:

альтреногест 0,4 г.

Допоміжні речовини: бутилгідрокситолуол, бутилгідроксианізол, рафінована соєва олія.

### 3. Фармацевтична форма

Розчин для перорального застосування.

### 4. Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QG03D – прогестагени.

Альтреногест – синтетичний прогестаген, що належить до сімейства 19-нор-тестостерону. Дія альтреногесту обумовлена за рахунок зниження концентрації в плазмі крові ендогенних гонадотропінів (ЛГ і ФСГ). Зниження концентрації гонадотропінів в плазмі крові спричиняє регресію великих фолікулів (> 5 мм) і не допускає утворення фолікулів більших 3 мм, що призводить до відсутності тічки і овуляції під час лікування.

Після завершення курсу лікування в плазмі крові спостерігають збільшення концентрації ЛГ, що призводить до стимуляції росту та дозрівання фолікулів.

Альтреногест швидко всмоктується після перорального застосування, пік концентрації у плазмі крові спостерігають впродовж 1-4 годин після застосування. Альтреногест метаболізується в основному в печінці і виводиться з жовчю. Період напіввиведення - близько 14 годин.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Свині.

#### 5.2 Показання до застосування

Ремонтним свинкам та свиноматкам для синхронізації тічки та покращення відсотку опоросу та кількості живонароджених поросят.

#### 5.3 Протипоказання

Не застосовувати тваринам із захворюваннями матки. Не застосовувати самцям.

#### 5.4 Побічна дія

Дотримуйтесь застосування рекомендованої дози щоденно впродовж усього курсу лікування, оскільки недотримання дозування може призвести до утворення кістозних фолікулів.

#### 5.5 Особливі застереження при використанні

Альтрезин слід додавати у корм безпосередньо перед згодовуванням. Видалити залишки корму з годівниць, що містять будь-які інші ветеринарні препарати. Застосовувати лише статевозрілим ремонтним свинкам, у яких вже була одна тічка. Рештки корму з препаратом слід утилізувати.

#### 5.6 Використання під час вагітності, лактації

Дозволяють застосовувати даний препарат під час вагітності чи лактації.

#### 5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не встановлена.

#### 5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Застосовують статевозрілим ремонтним свинкам після першої тічки індивідуально перорально з кормом або примусово безпосередньо в роту порожнину у дозі 5 мл (20 мг альтреногесту) на тварину один раз на добу протягом 18 діб.

Свиноматкам застосовують у день відлучення поросят індивідуально перорально з кормом або примусово безпосередньо в роту порожнину в дозі 5 мл (20 мг альтреногесту) на тварину один раз на добу протягом 3 діб.

Спосіб застосування (для флаконів ємністю 540 і 1080 мл): утримуючи флакон в горизонтальному положенні, повернути сопло дозатора вгору і повільно натиснути на курок, поки

на кінчику сопла не з'явиться крапля розчину.

Кожного наступного повного натискання на дозатор подаватиметься доза, що дорівнює 5 мл. Для регулярного застосування препарату утримуйте флакон з розчином вертикально догори дном. Не знімайте дозатор із пляшки до повного використання розчину. У проміжках між застосуванням препарату використовуйте блокатор дозатору.

Спосіб застосування (для флаконів ємністю 360 мл): натисніть і відпустіть насос-дозатор, щоб виділилась одна доза, що дорівнює 5 мл. Під час застосування флакон не струшувати.

Препарат розподіляють на поверхні корму безпосередньо перед ранковою годівлею.

Після припинення застосування препарату тічка, залежно від індивідуальних особливостей тварин, настає через 5-7 діб.

#### **5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)**

Не вивчали.

#### **5.10 Спеціальні застереження**

Альтрезин слід додавати у корм безпосередньо перед згодовуванням. Видалити залишки корму з годівниць, що містять будь-які інші ветеринарні препарати. Застосовувати лише статевозрілим свинкам, у яких вже була одна тічка. Рештки корму з препаратом слід утилізувати.

#### **5.11 Період виведення (каренції)**

7 діб.

#### **5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

При роботі із препаратом використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавички, халат), будьте обережні, уникайте контакту зі шкірою. При потраплянні препарату на шкіру чи слизові оболонки, слід негайно промити місце ураження проточною водою. Після роботи з препаратом слід ретельно промити руки з милом під проточною водою. Людям із підвищеною чутливістю до компонентів препарату, вагітним жінкам та жінкам дітородного віку слід уникати роботи із даним препаратом або проявляти крайню обережність при поводженні з цим продуктом. Людям з прогестероно-залежними пухлинами та тромбоемболічними захворюваннями слід уникати роботи із даним препаратом.

Побічна дія: абсорбція препарату через шкіру може призвести до порушення менструального циклу у жінок, виникнення маткових або спастичних болів у животі, підвищення або зниження маткової кровотечі, продовження вагітності та головних болів. У випадку виникнення побічних ефектів слід негайно звернутися до лікаря.

### **6. Фармацевтичні особливості**

#### **6.1 Форми несумісності**

Не встановили.

#### **6.2 Термін придатності**

36 місяців.

Після першого відкриття препарат слід використати впродовж 2 місяців.

#### **6.3 Особливі заходи зберігання**

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 5 °С до 25 °С.

#### **6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування**

Альтрезин випускають в алюмінієвих контейнерах ємністю 540 і 1080 мл та алюмінієвих аерозольних балонах ємністю 360 мл, упакованих в картонні коробки.

#### **6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками**

Всі невикористані матеріали та залишки препарату потрібно знешкодити відповідно до національних вимог.

**7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Сева Санте Анімаль	Ceva Sante Animale
10 авеню де ла балластієре,	10 avenue de la ballastière
33500 Лібурн	33500 Libourne
ФРАНЦІЯ	FRANCE

**8. Назва та місцезнаходження виробника готового продукту**

Сева Санте Анімаль	Ceva Sante Animale
З.І. Тре Ле Буа	Z.I. Tres le Bois
22600 Лудеак	22600 Loudeac
ФРАНЦІЯ	FRANCE

**Альтрезин**  
(розчин для перорального застосування)  
листівка-вкладка

**Опис**

Розчин для перорального застосування.

**Склад**

100 мл препарату містять діючу речовину:

альтrenoгест 0,4 г.

Допоміжні речовини: бутилгідрокситолуол, бутилгідроксианізол, рафінована соєва олія.

**Фармакологічні властивості**

АТС vet класифікаційний код QG03D– прогестагени.

Альтrenoгест – синтетичний прогестаген, що належить до сімейства 19-нор-тестостерону. Дія альтrenoгесту обумовлена за рахунок зниження концентрації в плазмі крові ендогенних гонадотропінів (ЛГ і ФСГ). Зниження концентрації гонадотропінів в плазмі крові спричиняє регресію великих фолікулів (> 5 мм) і не допускає утворення фолікулів більших 3 мм, що призводить до відсутності тічки і овуляції під час лікування.

Після завершення курсу лікування в плазмі крові спостерігають збільшення концентрації ЛГ, що призводить до стимуляції росту та дозрівання фолікулів.

Альтrenoгест швидко всмоктується після перорального застосування, пік концентрації у плазмі крові спостерігають впродовж 1-4 годин після застосування. Альтrenoгест метаболізується в основному в печінці і виводиться з жовчю. Період напіввиведення - близько 14 годин.

**Застосування**

Ремонтним свинкам та свиноматкам для синхронізації тічки та покращення відсотку опоросу та кількості живонароджених поросят.

**Дозування**

Застосовують статевозрілим ремонтним свинкам після першої тічки індивідуально перорально з кормом або примусово безпосередньо в роту порожнину у дозі 5 мл (20 мг альтrenoгесту) на тварину один раз на добу протягом 18 діб.

Свиноматкам застосовують у день відлучення поросят індивідуально перорально з кормом або примусово безпосередньо в роту порожнину в дозі 5 мл (20 мг альтrenoгесту) на тварину один раз на добу протягом 3 діб.

Спосіб застосування (для флаконів ємністю 540 і 1080 мл): утримуючи флакон в горизонтальному положенні, повернути сопло дозатора вгору і повільно натиснути на курок, поки на кінчику сопла не з'явиться крапля розчину.

Кожного наступного повного натискання на дозатор подаватиметься доза, що дорівнює 5 мл. Для регулярного застосування препарату утримуйте флакон з розчином вертикально догори дном. Не знімайте дозатор із пляшки до повного використання розчину. У проміжках між застосуванням препарату використовуйте блокувальний дозатор.

Спосіб застосування (для флаконів ємністю 360 мл): натисніть і відпустіть насос-дозатор, щоб виділилась одна доза, що дорівнює 5 мл. Під час застосування флакон не струшувати.

Препарат розподіляють на поверхні корму безпосередньо перед ранковою годівлею.

Після припинення застосування препарату тічка, залежно від індивідуальних особливостей тварин, настає через 5-7 діб.

**Протипоказання**

Не застосовувати тваринам із захворюваннями матки. Не застосовувати самцям.

**Застереження**

Альтрезин слід додавати у корм безпосередньо перед згодовуванням. Видалити залишки корму з годівниць, що містять будь-які інші ветеринарні препарати. Застосовувати лише статевозрілим ремонтним свинкам, у яких вже була одна тічка. Рештки корму з препаратом слід утилізувати.

**Форма випуску**

Альтрезин випускають в алюмінієвих флаконах ємністю 540 і 1080 мл та алюмінієвих аерозольних флаконах ємністю 360 мл, упакованих в картонні коробки.

**Зберігання**

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 5 °С до 25 °С.

**Термін придатності**

36 місяців.

Після першого відкриття препарат слід використати впродовж 2 місяців.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Сева Санте Анімаль	Ceva Sante Animale
10 авеню де ла балластієре,	10 avenue de la ballastière
33500 Лібурн	33500 Libourne
ФРАНЦІЯ	FRANCE

**Назва та місцезнаходження виробника готового продукту**

Сева Санте Анімаль	Ceva Sante Animale
З.І. Тре Ле Буа	Z.I. Tres le Bois
22600 Лудеак	22600 Loudeac
ФРАНЦІЯ	FRANCE

ALTRESYN  
RU-UA-BY  
ÉTQ : 360 ML  
CODE ARTICLE : 00000  
FORMAT/TYPE : 160x200  
CORPS : 9

Black  
Warm Red

LOUIS 07/03/14 - 13/03/14 - 24/07/14

**Альтрезин**  
Альтреногест

Раствор для орального применения  
Розчин для перорального застосування  
Альтреногест 4 мг/мл

PC T

360 мл

CEVA

#### ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Альтрезин® применяют половозрелым ремонтным свинкам для синхронизации эструса с целью формирования однородных технологических групп и повышения многоплодия. Свиноматкам Альтрезин® применяют после первого опороса для профилактики синдрома второго опороса (малоплодия).

**Перед применением баллон не встряхивать!**

Подробно см. инструкцию по применению внутри упаковки.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Подробно см. инструкцию по применению внутри упаковки.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробно см. инструкцию по применению внутри упаковки.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят Альтрезин® в упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от + 5°C до +25 °C.

**Хранить вдали от нагревательных приборов и огня!**

**Хранить в недоступном для детей месте!**

#### ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Альтрезин застосовують ремонтним свинкам та свиноматкам для синхронізації тчки та покращення таких показників, як процент опоросу та розмір гнізда (кількість живонароджених поросят).

Перед застосуванням балон не струшувати!

Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

#### ПРОТИПОКАЗАННЯ

Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

#### ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів в сухому, захищеному від світла місці за температури від + 5°C до +25 °C.

**Зберігати подалі від нагрівальних приладів і вогню!**

**Зберігати в недоступному для дітей місці!**

**РП№:**

**ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНИЙ МЕДИЦИНИ!**



00000 - Организация-производитель: «Селва», Санкт-Петербург, 10 Ленинградская Область, 335000, Либурн, Франция  
Адрес: место производства: «Селва», Санкт-Петербург, Индустриальный район, Пре-де-Буа, 22600, Турвези, Франция.  
Поставщик: ООО «Селва», Санкт-Петербург, Россия, 109428, ст. Москва, Рязанский проспект, д. 16, тел. (495) 729-59-90  
Владельцы регистрационного удостоверения: Селва, Санкт-Петербург, 10 Ленинградская Область, 335000, Либурн, Франция  
Виробник: Селва, Санкт-Петербург, 10 Ленинградская Область, 335000, Турвези, Франция

Селва  
Франция



**ЗАСТОСУВАННЯ**

Альтрезин застосовують ретельною гімнею та свідомо для суворих дій при та подолання всіх проявів, як проявів опоросу та розрив білків (включаючи імунодефіцитні паразити).

**Перед застосуванням балон не струшувати!**

Альтрезин застосовують спеціальним речовинним шприцом після першої тижня найменшого переривання з нормою або повільно дозує середньо в роті, пороченно в дозі 5 мл (20 мг альтрезину) на тварину один раз на добу протягом 18 днів. Свинкам Альтрезин застосовують з аптечними паразитами індивідуально пороченно з кормом або повільно дозує середньо в роті пороченно в дозі 5 мл (20 мг альтрезину) на тварину один раз на добу протягом 3 днів.

Альтрезин застосовують разом безпосередньо перед годуванням. Визначити кількість корму з годівель, що містять будь-які ветеринарні препарати. Застосовувати лише після годівель свинкам, у яких вже була одна тижня. Решта корму і препаратів слід утримувати.

Перед застосуванням завжди перевіряйте дату виготовлення.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ**

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю. Не застосовувати свинкам.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

При роботі із препаратом використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавички, каштані, бачок захисту, уникніть контакту зі шкірою). Для потрапляння препарату на шкіру на одразу обробити місця контакту промити місце ураження під проточною водою.

Після роботи з препаратом слід ретельно промити руки з милом під протічною водою. Людям із підвищеною чутливістю до компонентів препарату, вагітним жінкам та жінкам дитячого віку слід уникати роботи із цим препаратом, або працювати з ним обережно згідно вказівок з продуктом. Людям з протестерою слід уникати роботи на виробничих ліній завершуваних стад, у яких роботи із цим препаратом.

**ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати окремо від продуктів харчування та води в сумці захищеному від світла місці за температури від +5°C до +25°C.

Зберігати подалі від нагрівальних приладів і вогню!

Зберігати в недоступному для дітей місці!

**РПН:**

**ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!**

Власник реєстраційного посвідчення: Сана Санта Анімалс, 10 Avenue de la Biomédecine, 33500 Лібурн, ФРАНЦІЯ

Виробник готового продукту: Сана Санта Анімалс, 31, Rue de Buis, 22600 Лібурн, ФРАНЦІЯ

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕННЯ**

Альтрезин застосовують спеціальним речовинним шприцом після першої тижня найменшого переривання з нормою або повільно дозує середньо в роті, пороченно в дозі 5 мл (20 мг альтрезину) на тварину один раз на добу протягом 18 днів. Свинкам Альтрезин застосовують з аптечними паразитами індивідуально пороченно з кормом або повільно дозує середньо в роті пороченно в дозі 5 мл (20 мг альтрезину) на тварину один раз на добу протягом 3 днів.

**Перед застосуванням балон не струшувати!**

Альтрезин застосовують спеціальним речовинним шприцом після першої тижня найменшого переривання з нормою або повільно дозує середньо в роті, пороченно в дозі 5 мл (20 мг альтрезину) на тварину один раз на добу протягом 18 днів. Свинкам Альтрезин застосовують з аптечними паразитами індивідуально пороченно з кормом або повільно дозує середньо в роті пороченно в дозі 5 мл (20 мг альтрезину) на тварину один раз на добу протягом 3 днів.

Перед застосуванням Альтрезин з кормом, годівель розподіляють на поверхності норми несомнісності перед утриманням кормлення.

Перед однією годівелью навітряні балони слід встріхувати дозвільно дозує середньо в роті пороченно в дозі 5 мл.

Подорожно см інструкцію до повільно дозує середньо в роті пороченно в дозі 5 мл.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ**

Застереження: препарат Альтрезин застосовують тільки для свинків і свинок.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Слід уникати контакту з цим препаратом. При роботі з Альтрезином слід використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, каштані, бачок захисту, уникніть контакту зі шкірою). Для потрапляння препарату на шкіру на одразу обробити місця контакту промити місце ураження під проточною водою.

Після роботи з препаратом слід ретельно промити руки з милом під протічною водою. Людям із підвищеною чутливістю до компонентів препарату, вагітним жінкам та жінкам дитячого віку слід уникати роботи із цим препаратом, або працювати з ним обережно згідно вказівок з продуктом. Людям з протестерою слід уникати роботи на виробничих ліній завершуваних стад, у яких роботи із цим препаратом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранити Альтрезин в захищеному місці, окремо від продуктів харчування і води в сумці захищеному від світла місці за температури від +5°C до +25°C.

Хранити подалі від нагрівальних приладів і вогню!

Хранити в недоступному для дітей місці!

Не працювати після закінчення строків зберігання. Працювати по наданій ветеринарній інструкції. Стригати без ризику ветеринарного права.

**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Организаційно-виробничий: «Сана Санта Анімалс», 10 Avenue de la Biomédecine, 33500 Лібурн, Франція.

Датум виготовлення: Сана Санта Анімалс, 31, Rue de Buis, 22600 Лібурн, Франція.

Постачальник: ООО «Сана Санта Анімалс», Росія, 109428 м. Москва, Рязанський проспект, д. Нестор, (495) 725-5946.

360 мл

360 мл

CEVA

CEVA



ALTRIZIN  
BULADAY  
EVALU: 360 ML  
CODE ARTICLE: 0900  
FORMAT TYPE: 60x8x257  
COUNTRY: FR  
LCCS: 12/03/14 - 13/03/14 - 24/03/14 - 09/07/14

ALTRESYN BLACK  
RU-UA-BY ETO - 540ML  
CODE ARTICLE : 00000  
FORMAT : 100x210 mm  
CORPS : 6 pts

LOUIS 06/03/14

**Альтрезин**

Раствор для орального применения  
Розчин для перорального застосування  
Альтреногест 4 мг/мл

540 мл

Ceva

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

Альтрезин<sup>®</sup> применяют поворозьям ремонтных свиноматок и свиноматкам для синхронизации эструса с целью формирования однородных телок спринского типа и повышения выживаемости. Альтрезин<sup>®</sup> применяют поворозьями ремонтных свиноматок после первого эструса индивидуально перорально с кормом или поштучно, непосредственно в ротовую полость в дозе 5 мл (диаметром 20 мм) на животное один раз в день в течение 18 дней. Свиноматкам Альтрезин<sup>®</sup> применяют в день отъема сосисок индивидуально перорально с кормом или принудительно непосредственно в ротовую полость в дозе 5 мл (диаметром 20 мм) на животное один раз в день в течение 3 дней. При применении Альтрезина<sup>®</sup> свиноматки не могут распределять на поверхность корма непосредственно перед утением кормление. После прекращения дня эструса эструса, в зависимости от индивидуальных особенностей животных наступит через 5-7 дней.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Запрещается применять Альтрезин<sup>®</sup> свиноматкам при инфекционных болезнях матки и сосцда.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Следует избегать прямого контакта лекарственного препарата с мясом. Все работы с Альтрезин<sup>®</sup> должны проводиться в защитной одежде (костюм или комбинезон, перчатки, обувь, парашюти). По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Беременные женщины, находясь непосредственно вблизи людей с повышенной чувствительностью к гормонам Альтрезина<sup>®</sup> должны избегать контакта с лекарственным препаратом. Люди, проработавшие в течение последних 30 дней при тромбозамозии не допускаются к работе с Альтрезин<sup>®</sup>.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить Альтрезин<sup>®</sup> в упаковке производителя отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C.

**Хранить в недоступном для детей месте!**

Не применять после окончания срока годности. Применять по назначению ветеринарного врача. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Номер регистрационного удостоверения:

**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

**ЗАСТОСУВАННЯ**

Альтрезин застосовують ремонтним свиноматкам та свиноматкам для синхронизації еструсу та покращення таких показників, як процент отаросу та розмір нудки (кількість живородячих поросят). Альтрезин застосовують кашпоєдним, звичайним свиноматкам після першого індивідуального перорального в кормі або принудисно безпосередньо в ротову порожнину в дозі 5 мл (25 мм діаметром) на тварину один раз на день впротязі 18 днів. Свиноматкам Альтрезин застосовують у день відлучення поросят індивідуально перорально з кормом або принудисно безпосередньо в ротову порожнину 8 днів 3 мл (20 мм діаметром) на тварину один раз на день впротязі 3 днів. Препарат розподіляють на поверхню корму безпосередньо перед рівномірним годуванням.

Після припинення застосування препарату тварин в залежності від індивідуальних особливостей тварин наступ еструсу через 5-7 днів. Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію впакуванні!

**ПРОТИПОКАЗАННЯ**

Не застосовувати тваринам з захворюваннями матки. Не застосовувати самкам.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Для роботи з препаратом використовуйте засоби захисту (костюм, перчатки). Будьте обережні, уникайте контакту з шкірою. Після роботи і використання слід ретельно помити руки з милом під проточною водою. Люди із підвищеною чутливістю до компонентів препарату, вагітні жінки та жінки діючого віку слід уникати роботи із цим препаратом або підлягати одразу обсервації після завершення з цим препаратом. Людям з тромбоцитопенією, захворюваннями нирок, захворюваннями на тромбозомозіозі, захворюваннями судин, захворюваннями в інших органах.

**ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів в сухій, захищеній від світла місці за температурою від +5°C до +25°C.

**Зберігати в недоступному для дітей місці!**

**РПН:**

**ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ**

Сторінка 1 з 1  
Альтрезин<sup>®</sup> (Альтреногест) - це препарат, який використовується для синхронізації еструсу та покращення таких показників, як процент отаросу та розмір нудки (кількість живородячих поросят). Альтрезин застосовують кашпоєдним, звичайним свиноматкам після першого індивідуального перорального в кормі або принудисно безпосередньо в ротову порожнину в дозі 5 мл (25 мм діаметром) на тварину один раз на день впротязі 18 днів. Свиноматкам Альтрезин застосовують у день відлучення поросят індивідуально перорально з кормом або принудисно безпосередньо в ротову порожнину 8 днів 3 мл (20 мм діаметром) на тварину один раз на день впротязі 3 днів. Препарат розподіляють на поверхню корму безпосередньо перед рівномірним годуванням. Після припинення застосування препарату тварин в залежності від індивідуальних особливостей тварин наступ еструсу через 5-7 днів. Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію впакуванні!



