

LAPIMUN GEM-2, ЛАПІМУН ГЕМ-2**вакцина проти геморагічної хвороби кролів, інактивована.**

СКЛАД	<i>Активнодіючі компоненти в дозі вакцини:</i> - вірус геморагічної хвороби кролів штам «БГ-04» ≥ 640 ГАО; - вірус геморагічної хвороби кролів штам «ГБК-2» ≥ 640 ГАО.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Суспензія.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Введення вакцини захищає кролів від захворювання на геморагічну хворобу кролів, викликану каліцивірусом, впродовж 12 місяців, а захисні антитіла виробляються через 4-14 діб після вакцинації. Лікувальних властивостей не має.
ВИД ТВАРИН	Кролі.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Для профілактичної імунізації кролів проти геморагічної хвороби, викликаной каліцивірусом.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Вакцину не застосовують виснаженим та хворим кролям.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Дотримуватись правил асептики. Не використовувати вакцину з флаконів з тріщинами, без етикеток, порушенням закупорювання, невикористану впродовж семи діб після першого відбору або з закінченим терміном придатності. Дегельмінтизацію та дезінвазійні обробки тварин проводити до/або через 10-14 діб після щеплення.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Вакцину можна застосовувати одночасно з препаратом проти міксоматозу кролів LAPIMUN MIX, ЛАПІМУН МІКС – вакцина проти міксоматозу кролів, жива, яку вводять з протилежної сторони тіла підшкірно в ділянці лопатки.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ЛАКТАЦІЇ	З метою уникнення абортів через стрес не рекомендується вакцинувати крильчих за сім діб до окролу. Лактуючих кролематок вакцинують незалежно від терміну окролу.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину вводять клінічно здоровим кролям підшкірно за лопаткою в дозі по 1,0 мл з 28 денного віку. У разі виникнення загрози раннього інфікування всіх кролів, досягнувши 28 денного віку та старших вакцинують одноразово незалежно від термінів попередньої вакцинації. Тварин батьківського стада, за інтенсивного використання, рекомендується вакцинувати двічі з інтервалом 6 місяців.
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	У неблагополучних пунктах (господарствах) після вакцинації можлива загибель тих тварин, які були в інкубаційному періоді або інфіковані епізоотичним вірусом геморагічної хвороби кролів.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ (СИМПТОМИ, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ)	Введення 2-х доз вакцини не викликає негативних побічних явищ.
ПЕРІОД ВИВЕДЕННЯ (КАРЕНЦІЇ)	Нуль діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації. У разі випадкової самоін'єкції необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на даний препарат.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ	Невикористану вакцину, з закінченим терміном дії, голки, шприці та флакони з залишками вакцини знезаражують кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. Після першого відбору з флакону – 7 діб.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ	В темному, недоступному для дітей місці, при температурі від 2°C до 8°C. Впродовж 7 діб після першого відбору з флакону – при температурі від 2°C до 8°C Не заморозувати! Нетривале, до 3 годин, підвищення температури навколишнього середовища, у процесі зберігання препарату під час вакцинації не впливає негативно на якість вакцини.
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Флакони зі скла або пластику, закриті гумовою пробкою та алюмінієвим ковпачком, що містять по 10; 20; 50 або 100 доз вакцини.
НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕ- ННЯ ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ І ВИРОБНИКА	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А, Україна Адреса виробництва: 03143 м. Київ, вул. Академіка Лебедева, 1; 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістового Олександра, буд. 1/3, Україна www.biotechlab.ua
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	Без рецепта.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.