

LAPIMUN GEMIX, ЛАПІМУН ГЕМІКС



вакцина проти геморагічної хвороби та міксоматозу кролів.

Склад	До складу вакцини входять два компоненти з однаковою кількістю доз. Одна доза вакцини містить: - інактивований вірус геморагічної хвороби кролів (суспензія) штам БГ-04 від ≥ 640 ГАО. - Живий вакцинний вірус міксоматозу кролів (ліофілізат) штам "MAV/RK-13/20" $\geq 10^{4,0}$ ТЦД ₅₀ .
Фармацевтична форма	Суспензія і ліофілізат.
Імунобіологічні властивості	Введення вакцини захищає кролів від захворювання на геморагічну хворобу та міксоматоз, захисні антитіла формуються через 7-14 діб після вакцинації. Тривалість імунітету проти геморагічної хвороби складає не менш ніж 12 місяців, та не менш ніж 9 місяців проти міксоматозу.
Вид тварин	Кролі.
Показання до застосування	Для профілактичної імунізації кролів проти геморагічної хвороби (ГХК) та міксоматозу.
Протипоказання	В господарствах вакцинують лише клінічно здорових кролів.
Застереження при застосуванні	Не застосовувати вакцину з флаконів з тріщинами, з порушенням закупорювання та маркування, а також вакцину зі зміною кольору та консистенції, невикористану впродовж 3-х годин після розчинення або заморожену.
Взаємодія з іншими засобами	Не змішувати з лікарськими та профілактичними препаратами в т.ч. проти хвороб кролів та компонентами інших серій вакцини LAPIMUN GEMIX, ЛАПІМУН ГЕМІКС – вакцина проти геморагічної хвороби та міксоматозу кролів.
Особливі вказівки при вагітності, лактації	Для уникнення абортів внаслідок стресу не рекомендується вакцинувати кролиць за сім діб до окролу.
Спосіб застосування та дози	Безпосередньо перед застосуванням за допомогою стерильного шприца із флакону з розчинником відібрати 5 мл суспендованого компоненту вакцини та перенести у флакон із ліофілізованим компонентом вакцини. Ретельно перемішати до повного розчинення ліофілізату, після чого шприцем перенести розчин у флакон з суспендованим компонентом вакцини. Для повного перенесення ліофілізованої вакцини операцію повторити. Після розчинення вакцину вводять клінічно здоровим кролям з 28 денного віку підшкірно за лопатку в дозі по 1,0 мл з повторною вакцинацією у віці 4-х місяців. У разі виникнення загрози раннього інфікування всіх кролів, досягнувши 28 денного віку та старших, вакцинують незалежно від термінів попередньої вакцинації з повторною вакцинацією через три місяці вакциною LAPIMUN GEMIX, ЛАПІМУН ГЕМІКС або LAPIMUN MIX, ЛАПІМУН МІКС- вакцина проти міксоматозу кролів, жива. Ревакцинацію кролів проводять кожні 8 місяців. Вакцинованих тварин батьківського стада, за інтенсивного використання, рекомендується ревакцинувати з інтервалом 6 місяців.

Побічні ефекти	В окремих випадках на шкірі, в ділянці голови, виникають міксоми, які не впливають на загальний стан здоров'я тварин і зникають впродовж тижня без лікування. У неблагополучних пунктах (господарствах) після імунізації можлива загибель тих тварин, які були інфіковані епізоотичним вірусом геморагічної хвороби або міксоматозу кролів.
Період виведення (каренції)	Нуль діб.
Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІЗ	В разі випадкової самоін'єкції необхідно звернутися до лікаря та надати йому листівку-вкладку на препарат. Дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та роботи з кролями.
Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІЗ, способи його знешкодження і утилізації	Вакцину з закінченим терміном придатності, невикористану впродовж 3-х годин після розчинення та шприці з голками необхідно знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
Термін придатності	24 місяці. Після розчинення вакцину використати впродовж 3-х годин.
Умови зберігання і транспортування	В темному, недоступному для дітей місці, при температурі від 2 до 8°C.
Упаковка	Флакони зі скла або пластику, закриті гумовою пробкою та закатані алюмінієвим ковпачком, що містять по 10; 20; 50 або 100 доз вакцини.
Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення	ТОВ „БІОТЕСТЛАБ”, 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А.
Назва та місцезнаходження виробників	03143, м. Київ, вул. Лебедєва, 1; 08600, Київська обл., Обухівський р-н, м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
Правила відпуску	Без рецепта.
Додаткова інформація	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 по три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.