

**LAPIMUN MIX, ЛАПІМУН МІКС**

Вакцина проти міксоматозу кролів, жива.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Склад</b>                                     | Вірус міксоматозу кролів штам «MAV/RK – 13/20» $\geq 10^{4,0}$ ТЦД <sub>50</sub> в дозі. Розчинник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Фармацевтична форма</b>                       | Ліофілізат, або ліофілізат та розчинник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Імунобіологічні властивості</b>               | Вакцина стимулює формування імунітету до вірусу міксоматозу через 4-9 днів після вакцинації, що триває 8-10 місяців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Вид тварин</b>                                | Кролі, включно з карликовими породами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Показання до застосування</b>                 | Профілактична імунізація кролів проти міксоматозу. Лікувальних властивостей не має.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Протипоказання</b>                            | Не застосовують кволим, хворим і кролям з гострими та загальними захворюваннями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Застереження при застосуванні</b>             | Не використовувати вакцину з флаконів з тріщинами, без етикеток, порушенням закупорювання та маркування, невикористану впродовж 3-х годин після розчинення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Взаємодія з іншими засобами</b>               | Вакцину можна застосовувати одночасно з вакцинами «LAPIMUN GEM, ЛАПІМУН ГЕМ – вакцина проти геморагічної хвороби кролів» та «LAPIMUN GEM-2, ЛАПІМУН ГЕМ-2 – вакцина проти геморагічної хвороби кролів», які вводять з протилежної сторони тіла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Застосування під час вагітності, лактації</b> | Для уникнення абортів внаслідок стресу не рекомендується вакцинувати кролиць за сім діб до окролу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Спосіб застосування та дози</b>               | <p>Для розчинення вакцини використовують розчинник для вакцин або стерильний фізіологічний розчин. Безпосередньо перед використанням вакцину розчиняють із розрахунку 1,0 мл розчинника на одну дозу.</p> <p>Із флакону розчинника або стерильного фізіологічного розчину необхідно відібрати шприцем п'ять мілілітрів розчинника і перенести у флакон з ліофілізатом, злегка збовтати, до повного розчинення ліофілізату, відібрати шприцем розчинений матеріал та перенести до флакону з розчинником.</p> <p>Процедуру проводять двічі, для перенесення всього об'єму вірусу міксоматозу у флакон з розчинником.</p> <p>Вакцину вводять підшкірно за лопаткою в дозі 1,0 мл.</p> <p>Кролів у благополучній зоні щеплять одноразово з 10-тижневого віку.</p> <p>У неблагополучній зоні клінічно здорових кролів можна вакцинувати, починаючи з 4-тижневого віку. Кроленят, яких вакцинують вперше, повторно вакцинують в 4-місячному віці. У разі загрози раннього інфікування всіх кролів, що досягли 28 денного віку та старших, вакцинують одноразово незалежно від термінів попередньої вакцинації.</p> <p>Дорослих кролів перший раз вакцинують за 7 днів до парування.</p> <p>В подальшому вакцинацію тварин проводять кожні 8 місяців.</p> <p>Вакцинованих тварин батьківського стада, за інтенсивного використання, рекомендується ревакцинувати з інтервалом 6 місяців.</p> |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Передозування</b>                                                                                        | Не викликає захворювання кролів на міксоматоз при введенні 10 доз вакцини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Побічні ефекти</b>                                                                                       | В окремих випадках введення вакцини може викликати, підвищення температури тіла до одного градуса та тимчасове зниження апетиту на 1-2 дні. Рідко на шкірі в ділянці голови, виникають міксоми, які не впливають на загальний стан здоров'я тварин і зникають впродовж тижня без лікування.<br>У неблагополучних пунктах (господарствах) після імунізації можлива загибель тих тварин, які були інфіковані епізоотичним вірусом міксоматозу кролів.                                                                                                                                |
| <b>Період виведення (каренції)</b>                                                                          | Нуль діб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІЗ</b>                    | В разі випадкової самоін'єкції необхідно звернутися до лікаря та надати йому листівку-вкладку на препарат.<br>Дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та роботи з кролями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІЗ, способи його знешкодження та утилізації</b> | Невикористану впродовж 3-х годин розчинену вакцину, розчинник та вакцину з закінченим терміном придатності, використані шприці та голки необхідно знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Термін придатності</b>                                                                                   | 24 місяці. Після розчинення вакцину використати впродовж 3-х годин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Умови зберігання і транспортування</b>                                                                   | Вакцину зберігати в темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8 °С, або до мінус 20 °С.<br>Розчинник зберігати в темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8 °С. Забороняється заморожувати розчинник!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Упаковка</b>                                                                                             | Флакони зі скла, закриті гумовою пробкою та закатані алюмінієвим ковпачком, що містять по 5, 10, 20, 50 або 100 доз вакцини.<br>Розчинник у скляних або пластикових флаконах по 5, 10, 20, 50 або 100 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення</b>                                        | ТОВ „БІОТЕСТЛАБ”,<br>08601 Київська обл., м. Васильків,<br>вул. Володимирська, 57-А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Адреса виробництва:</b>                                                                                  | 08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Лістового Олександра, буд. 1/3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Правила відпуску</b>                                                                                     | Без рецепта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Додаткова інформація</b>                                                                                 | Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника).<br>Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 по три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ. |