

Шкіра та шерсть без грибка



ЕНКОН

концентрат емульсії для зовнішнього застосування



1 мл містить:
еніконазол – 100 мг

- ✓ Абсолютно безпечний через низьку системну дію
- ✓ Ефективний завдяки потужній місцевій дії
- ✓ Для лікування достатньо 3-4 процедури

Здоров'я тварин – турбота про людей



ДОЛАЄ:

- дерматомікози (трихофітія, мікроспорія)
- дріжджові гриби (кандидоз, маласезіоз)
- дмішані грибові інфекції шкіри



ТОВ «БРОВАФАРМА»
б-р Незалежності, 18 А, м. Бровари
Київська обл., Україна, 07400



brovapharma
тел.: +38 044 599 32 24
www.brovapharma.ua

ДИВІТЬСЯ
НА САЙТІ



ЕНКОН

концентрат емульсії для
зовнішнього застосування

ПР № АВ-09539-01-22

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Опис

Рідина жовто-бурштинового кольору, густа, прозора.

Упаковка

Скляні або полімерні флакони по 10, 100 мл, полімерні канистри по 1000 мл.



Фармакологічні властивості

Енілконазол – синтетичний фунгіцид широкого спектра дії, активний проти різних видів патогенних мікроміцетів, у тому числі збудників трихофітії та мікроспорії – *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton equinum*, *Microsporum canis*, *Microsporum gypsum*.

Вибірково інгібує біосинтез ергостерину – основного компонента клітинної оболонки мікроміцетів та дріжджів, що призводить до незворотних змін у стінках їхніх клітин.

При локальному зовнішньому застосуванні енілконазол має низьку системну доступність, погано всмоктується через шкіру, лише у незначній кількості проникає у тканини. Виводиться з організму тварин переважно з сечею і калом. Період напіввиведення становить 12-16 годин.

Показання

Лікування коней, собак, котів за дерматомікозів, які спричинені мікроорганізмами, чутливими до енілконазолу.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до діючої або допоміжних речовин препарату.

Спосіб застосування та дози

Перед використанням препарат змішують з теплою водою у співвідношенні 1:50 і отримують робочу емульсію 2%. Змочують в ній щітку або м'яку тканину та обережно очищають від кірок та бруду уражені ділянки шкіри та навколо них, а потім покривають їх емульсією.

Собакам і котам засіб наносять проти шерсті. Тварин дрібних порід можна занурювати в ємність із лікувальною емульсією. Довгошерстих вихованців перед обробкою необхідно постригти.

Лікування проводять 4 рази через 3-4 дні. У тяжких випадках курс лікування можна продовжити після консультації з ветеринарним лікарем.

Застереження

Для запобігання повторного зараження всі речі, з якими контактувала хвора тварина (упряж, щітки, віники, лопати, скребки, будки, кошки, нашійники тощо), промивають у робочій емульсії препарату або обприскують нею чи іншими фунгіцидними засобами.

Емульсію готують безпосередньо перед нанесенням.

Не використовувати одночасно з іншими фунгіцидними засобами для місцевого застосування.

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними засобами, й застосовувати захисний одяг (гумові рукавички). Уникати потрапляння препарату на шкіру. Після закінчення робіт необхідно вимити руки теплою водою з милом.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці за температури від +5 до +25 °С.

Після відкриття флакона препарат зберігати герметично закритим і використати протягом 3 місяців.

Термін придатності

2 роки.

Безкоштовна
консультація:

+38 050 315 73 08

 **Брoвaфaрмa®**

Здоров'я тварин – турбота про людей

