

БРОВАДЕЗ-ПЛЮС
(розчин для дезінфекції)
листівка-вкладка

Опис

Прозора рідина, жовтуватого кольору із слабким специфічним запахом, добре змішується з водою.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини (г):

алкілдиметилбензиламонію хлорид – 10;

дидецилдиметиламонію хлорид – 5.

Допоміжні речовини: етилендіамін-тетра-оцтова кислота (ЕДТОК), берол, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код:

QV07AV-Технічні дезінфектанти.

Препарат має бактерицидну та спороцидну дію на більшість грампозитивних і грамнегативних бактерій (*Brucella spp.*, *Clostridium spp.*, *Klebsiella spp.*, *Listeria spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *C. jejuni*, *C. fetus*, *E. coli*, *Lactobacillus arten*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Y. enterocolitica* тощо); віруциду дію на РНК-вмісні віруси (*Avibirnavirus*, *Paramixovirus*, *Orthomixovirus*) і ДНК-вмісні віруси (*Parvovirus*, *Dependovirus*, *Aviadenovirus*, *Avipoxvirus*, *Circovirus*).

Препарат діє антипротозойно на еймерії (*E. tenella*, *E. maxima*, *E. acervulina*, *E. necatrix*, *E. mitis* тощо); фунгіцидно на гриби (*Aspergillus spp.*, *Candida albicans*, *Trichophyton spp.*, *Saccharomyces cerevisia* тощо); алгацидно на зелені водорості; має дезодоруючі властивості.

Застосування

Препарат застосовують для дезінфекції, деконтамінації та дезінвазії різноманітних об'єктів які підлягають ветеринарному нагляду, а саме:

- дільниць технологічного циклу птахівничої галузі (інкубаторії і передінкубаційна санація яєць, забезпечення чистоти системи водопостачання і підтримки оптимального бактеріального фону питної води);
- обладнання, боєнь і цехів по переробці м'ясних, молочних та інших продуктів тваринного походження;
- торгівельних, лабораторних приміщень та їх інвентарю;
- транспортних засобів для продукції тваринного походження та в зонах карантинування;
- різноманітних тваринницьких приміщень, а також будок, кліток та інших місць утримання дрібних тварин і птиці, особливо після їх дегельмінтизації;
- санації водопровідних систем та ліній подачі рідких кормів в свинарниках та звірогосподарствах;
- контролю зелених водоростей в технологічних басейнах і системах зберігання води.

Дозування

Вологу дезінфекцію проводять розчинами препарату відповідної робочої концентрації, які готують шляхом змішування препарату із звичайною нехлорованою водою.

Робочі розчини наносять на контрольовані поверхні за допомогою різноманітних дрібнодисперсних оприскувачів до повного їх зволоження або протирання всіх частин губкою.

Використовують робочі розчини препарату наступних концентрацій з розрахунку 0,3-0,5 л/м² поверхні:

- **0,05%** (5 мл на 10 л води) – запобігання розмноженню зелених водоростей та інших мікроорганізмів в закритих басейнах та системах водопостачання;
- **0,1%** (10 мл на 10 л води) – санація доїльного обладнання і молокопереробних об'єктів, годівниць, поїлок та питної води для тварин і птиці;
- **0,25%** (25 мл на 10 л води) – профілактична дезінфекція приміщень та інвентарю в присутності тварин чи птиці та для дезінфекції інкубаційних яєць;

– **0,5%** (50 мл на 10 л води) – асептичне прибирання боєнь, м'ясопереробних цехів, холодильних камер, санація обладнання інкубаторіїв, торгівельних, лабораторних приміщень, транспортних засобів;

– **1,0%** (100 мл на 10 л води) – профілактична дезінфекція обладнання, бункерів і приміщень кормоцехів та тваринницьких приміщень під час санітарних розривів, знезараження інструментів;

– **1,5%** (150 мл на 10 л води) – поточна дезінфекція та дезінвазія місць утримання хворих тварин та птиці, в т.ч. і при контамінації приміщень мікобактеріями; дезінфекція коліс транспортних засобів при перетині зон карантинування;

– **2,0%** (200 мл на 10 л води) – дезінвазія при протозойних хворобах тварин та птиці;

– **3,0%** (300 мл на 10 л води) – вимушена та поточна дезінфекція в комплексі заходів по оздоровленню господарств від туберкульозу.

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження

При роботі з розчинами препарату слід дотримуватись загальних правил гігієни та безпеки. Персонал, який виконує роботи з дезінфекції має бути забезпечений засобами індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей: спецодяг (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини, гумові рукавички, захисні окуляри типу ПО-2 чи моноблок, респіратор типу «Лепесток»).

Розчини у концентрації понад 2,5% можуть викликати подразнення шкіри, тому при роботі з ними слід використовувати гумові рукавиці та захисні окуляри. При попаданні нерозведеного препарату на відкриті частини тіла, їх негайно промивають проточною водою.

Забороняється палити, пити, приймати їжу під час виконання робіт з дезінфекції. Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити водою з милом.

Форма випуску

Флакони зі скла або полімерних матеріалів по 10; 20; 50; 100; 250; 500 мл та канистри з полімерних матеріалів по 1; 3; 5; 10 та 20 л.

Зберігання

Сухі складські приміщення, які захищені від дії прямих сонячних променів, в упаковці виробника при температурі від 0°C до 25°C, в недоступних для дітей місцях. Не допускати замерзання та перегріву препарату.

Термін придатності – 4 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «БРОВАФАРМА»,

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна,

Виробник готового продукту:

ТОВ «БРОВАФАРМА»,

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари Київської обл., 07400, Україна,

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1