


ІВЕРОН-10	
	
Розчин для ін'єкцій	
ОПИС	Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору.
СКЛАД	1 мл препарату містять діючу речовину: івермектин - 10,0мг. Допоміжні речовини: етиловий спирт, бензиловий спирт, полівінілпіролідон, поліетиленгліколь, гліцерин.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	ATC vet класифікаційний код QP54 – Ендектоциди (Endectocides), QP54AA – Авермектини. ATC vet код QP54AA01 - Івермектин (Ivermectin). Діючою речовиною препарату є івермектин, який належить до сполук групи авермектинів, що продукуються мікроорганізмами групи <i>Streptomyces avermitis</i> . Механізм дії препарату на організм паразита полягає у тому, що івермектин стимулює виділення гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) в пресинаптичних нейронах, яка зв'язується зі спеціальними рецепторами нервових закінчень, збільшуючи проникність мембран для іонів хлору і блокуючи передачу нервово-м'язових імпульсів. Це викликає параліч та загибель паразитів. Івермектин має високу ефективність та широкий спектр дії (інсектицидна, акарицидна та нематоцидна) і відносно низьку токсичність. Івермектин не ефективний щодо трематод і стьожкових червів, оскільки у них ГАМК не функціонує як периферичний нейромедіатор.
ЗАСТОСУВАННЯ	Лікування і профілактика захворювань, викликаних: -Велика рогата худоба: Шлунково-кишковими нематодами: <i>Nematodirus helvetianus</i> , <i>Ostertagia ostertagi</i> (статевозрілі і личинки 4-ї стадії), <i>O. lyrata</i> ; <i>Bunostomum trigonocephalum</i> , <i>B. phlebotomum</i> , <i>Haemonchus placet</i> (в т.ч. личинки 3-ї стадії), <i>Trichostrongylus axei</i> , <i>T. colubriformis</i> , <i>Cooperia pectinata</i> , <i>C. Punctata</i> ; Легеневими нематодами: <i>Dictyocaulus viviparus</i> (статевозрілі і личинки 4-ї стадії); Личинками підшкірного овода (1-ї і 2-ї стадії): <i>Hypoderma bovis</i> , <i>H. lineatum</i> ; Коростяними кліщами: <i>Psoroptes bovis</i> , <i>Sarcoptes bovis</i> , <i>Chorioptes bovis</i> ; Кліщами: <i>Demodex bovis</i> ; Вошами: <i>Haematopinus eurytystemus</i> , <i>Linognathus vituli</i> ; -Вівці: Шлунково-кишковими нематодами: <i>Haemonchus contortus</i> (статевозрілі та личинки 3-ої та 4-ої стадії), <i>Ostertagia circumcincta</i> (статевозрілі та личинки 3-ї та 4-ї стадії), <i>Ostertagia trifurcata</i> (статевозрілі та личинки 4-ої стадії), <i>Trichostrongylus spp.</i> ; Легеневими нематодами: <i>Dictyocaulus filaria</i> (статевозрілі та личинки 4-ої стадії), <i>Protostrongylus rufescens</i> (статевозрілі); Носоглотковим оводом: <i>Oestrus var.comunis</i> (всі личинкові стадії); Коростяними кліщами: <i>Sarcoptes scabiei</i> , <i>Psoroptes var. communis ovis</i> ; -Свині: Шлунково-кишковими нематодами: <i>Ascaris suum</i> , <i>Hyostrongylus rubidus</i> (статевозрілі та личинки 4-ї стадії), <i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Strongyloides ransomi</i> (статевозрілі); Легеневими нематодами: <i>Metastrongylus spp.</i> (статевозрілі); Вошам: <i>Haematopinus suis</i> ; Коростяними кліщами: <i>Sarcoptes suis</i> .

ДОЗУВАННЯ	<p>Препарат застосовують одноразово: <i>-Великій рогатій худобі та вівцям:</i> 0,2 мл на 10 кг маси тіла (0,2 мг/кг івермектину), підшкірно у ділянку лопатки; <i>-Свиням:</i> 1,0 мл на 33 кг маси тіла (0,3 мг/кг івермектину), внутрішньом'язово у ділянку шиї. Терапію гіподермозу великої рогатої худоби (жовтень-листопад) рекомендовано проводити в дозі 0,2 мл на 10 кг маси тіла (0,2 мг/кг івермектину). При лікуванні тварин уражених коростою, демодекозом, хоріоптозом введення препарату повторюють через 7-10 днів у таких же дозах. Якщо доза препарату перевищує 10 мл, то її вводять у декілька місць.</p>
ПРОТИПОКАЗАННЯ	<p>Не застосовувати для нецільових тварин. Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до івермектину. Не можна вводити препарат внутрішньом'язово або внутрішньовенно. Не застосовувати одночасно з іншими антигельмінтними засобами. Не застосовувати для ослаблених, виснажених та хворих інфекційними хворобами тварин, а також тваринам з захворюваннями печінки та нирок. Дуже важлива точність дозування для свиней масою тіла до 16 кг.</p>
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	<p><i>Побічна дія</i> При застосуванні за показаннями у рекомендованих дозах побічних явищ та ускладнень, як правило, не спостерігається. На місці ін'єкції може виникнути незначна припухлість, яка не потребує лікування. <i>Використання під час вагітності, лактації</i> Забороняється застосовувати самкам за два тижні до пологів і протягом двох тижнів після них та лактуючим тваринам, молоко яких призначене для споживання людьми. <i>Період виведення (каренції)</i> Забій тварин на м'ясо дозволяється через 28 днів після останнього застосування препарату. У випадку вимушеного забою тварин раніше встановленого терміну м'ясо згодовують непродуктивним тваринам або утилізують, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.</p>
ФОРМА ВИПУСКУ	<p>Флакони з темного скла, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 10, 50 та 100 мл.</p>
ЗБЕРІГАННЯ	<p>Темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5 до 25° С. Термін придатності - 2 роки. Після першого відбору з флакону - 28 днів за умов зберігання його у темному місці за температури від 5 до 25° С.</p>
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!	
ВЛАСНИК РЕЕСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	<p>ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А, Україна.</p>
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ	<p>ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А, Україна.</p>