

БІ-СІЛЬ
(порошок для перорального і зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Порошок білого кольору гігроскопічний.

Склад

100 г препарату містить (г):

натрію сульфат безводний 90,0,

натрію гідрокарбонат 10,0.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QA06AD10 Мінеральні солі у комбінації.

Завдяки співвідношенню складників, водний розчин препарату активізує секреторну функцію травного каналу, має протизапальну, гепатопротекторну, жовчогінну, панкреатостимулюючу і сечогінну дії, позитивно впливає на ліпідний та вуглеводний обміни.

У невеликих дозах і тривалому застосуванні сполуки натрію активізують секрецію, моторику і перистальтику шлунку і кишечника, покращують апетит та процеси травлення у тварин, пришвидшують обмін речовин.

При вищій концентрації (3-8 % водного розчину) препарат має проносну дію, яка настає через 5-7 годин після застосування. При переповненому шлунку кормовими масами має пройти значно більше часу.

Послаблююча дія препарату супроводжується пониженням всмоктування із кишечника, що необхідно при наявності у ньому токсичних речовин.

Застосування гіпертонічного розчину препарату для промивання гнійних ран (у першій фазі загоєння) активізує відтік лімфи, пришвидшує виведення токсинів, очищення і загоєння ран.

Застосування

Великій рогатій худобі, вівцям, козам, коням, свиням, собакам, курям, качкам застосовують для покращення травлення в комплексній терапії хвороб інвазійної етіології.

Як послаблюючий засіб при гіпотонії і атонії передшлунків, спазмах кишечника, переїданні, для виведення із травного каналу токсинів, відволікаючої терапії при ексудативних запаленнях.

У формі 1-2% водного розчину препарат застосовують для промивання передшлунків жуйним тваринам, шлунку коням, собакам, очисних клізм.

Гіпертонічний розчин застосовують для промивання гнійних ран (у першій фазі загоєння).

Дозування

При пероральному застосуванні водний розчин препарату вводять тварині примусово, (доза вказані у таблиці 1).

Таблиця 1

Вид тварин	Доза (препарат у грамах/10 кг маси тіла)	
	для покращення травлення	для послаблюючої дії
велика рогата худоба	0,7-0,8	8,0-9,0
вівці, кози	0,9-1,0	10,0
коні	0,4-0,5	5,0-6,0
свині	0,2-0,3	2,5-3,0
собаки	0,2	3,0-4,0
кури	1,0-1,2	10,0-12,0
качки	0,9-1,0	9,0-10,0

Протипоказання

Не застосовувати при внутрішніх кровотечах, підозрі на непрохідність кишечника, погіршенні функціонального стану нирок.

2 0. 1 0. 2017

Застереження

При застосуванні послаблюючих доз препарату необхідно враховувати зниження резорбційних властивостей інших пероральних лікарських засобів.

Форма випуску

Пакети з полімерного матеріалу, об'ємом 50, 100, 400 г, 1 і 5 кг, контейнери з полімерного матеріалу, об'ємом 100 і 250 г, мішки з полімерного матеріалу, об'ємом 10 кг.

Зберігання

Суше темне, недоступне для дітей, місце при температурі від мінус 30 до 30 °С.

Термін придатності — 5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18 а, м. Бровари Київської обл., 07400, Україна