

Бровермектин™ гель
(гель для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Однорідний гель білого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

івермектин - 4,0 мг.

Допоміжні речовини: тилоза, твін-80, вода дистильована.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP54, ендектоциди (QP54AA01, івермектин)

Івермектин належить до хімічної групи макроциклічних лактонів. Фармакологічна дія препарату полягає у блокуванні провідності хлоридних іонних каналів, що порушує нормальну передачу нервових імпульсів і призводить до паралічу і загибелі паразитів.

Застосування

Лікування і профілактика коней при інвазійних захворюваннях, які спричинюються збудниками:

- нематодами шлунково-кишкового каналу - *Ascaridae*, *Strongylidae*, *Strongyloididae*, *Oxyurata*, *Trihomonatidae* (*Cyatomidae*), *Spiruridae*;
- легеневиими нематодами - *Dictyocaulus spp.*;
- нематодами - *Parafilaria multipapillosa*, *Onchocerca cervicalis*;
- личинками - *Gasterophilus spp.*

Дозування

Доза препарату - 1 мл препарату на 20 кг маси тіла тварини, одноразово.

Препарат вводять за допомогою шприца-туби на корінь язика.

Протипоказання

Не застосовують лошатам до 4-х місячного віку!

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 28 діб після останнього введення препарату. У випадку забою раніше встановленого терміну м'ясо використовують для годівлі м'ясоїдних тварин або для виготовлення м'ясо-кісткового борошна, відповідно до висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Шприц-туби по 20 мл або 30 мл.

Зберігання

Сухе, захищене від світла місце при температурі від 1°C до 20°C.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності 18-а,

м. Бровари Київської обл., 07400

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності 18-а,

м. Бровари Київської обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ

ПРИМІРНИК № 1