

Гельмісан®
(Гель для внутрішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Однорідний гель світло-жовтого кольору без вираженого запаху.

Склад

1 мл препарату містить активно діючі речовини (мг):

пірантелу памоат – 300,0

празиквантел – 20,0.

Допоміжні речовини: тілоза, вода дистильована.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празиквантел, комбінації)

Пірантел памоат належить до похідних піримідину. Діє у відношенні круглих гельмінтів (статевозрілих стадій та личинок 4-ї стадії розвитку), як деполаризуючий міорелаксант, який викликає нервово-м'язову блокаду, паралізує м'язи, що спричиняє загибель нематод.

Празиквантел – похідна сполука хіноліну. Підвищує проникність клітинних мембран для іонів кальцію у цестод і трематод, що призводить до генералізованого скорочення м'язів, паралічу гельмінтів та їх загибелі, а також викликає вакуолізацію та пошкодження епітелію паразитів, що робить їх чутливими до ферментів кишкового тракту.

Застосування

Дегельмінтизація однокопитих тварин (коні, поні, кулани, коні Пржевальського) при ураженні нематодами, цестодами, трематодами:

– нематодози травного каналу родин: *Ascaridae*, *Strongylidae* підродин *Strongylidae* та *Cyathostomidae* (*Trihonomatidae*), *Strongyloididae*, *Oxyuridae*, *Spiruridae*;

– цестодами родини *Anoplocephalidae*;

– трематодами родини *Schistosomatidae*, *Dicrocoeliidae*;

– личинками оводів *Gasterophilus spp.*

Дозування

Терапевтична та профілактична доза становить 1 мл препарату на 20 кг маси тіла. Препарат вводять за допомогою шприца-туби на корінь язика одноразово. При інвазіях, викликаних личинками *Trihostrongylus axei*, тваринам вводять препарат двічі з добовим інтервалом.

Профілактичну дегельмінтизацію дорослих коней проводять один раз в 3-4 місяці.

Для дегельмінтизації диких тварин визначену дозу препарату змішують зі зволеним комбікормом і згодовують ранком індивідуально або груповим способом.

Протипоказання

Не застосовувати клінічно хворим, виснаженим тваринам.

Застереження

Не застосовувати вагітним самкам в останній тиждень вагітності.

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 7 діб після останнього застосування препарату.

Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Шприц – туби з дозатором по 20 та 30 мл.

Зберігання

У сухому, недоступному для дітей, захищеному від прямих сонячних променів приміщенні при температурі від 1 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)
б-р Незалежності 18 а, м. Бровари
Київської обл., 07400

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)
б-р Незалежності 18 а, м. Бровари
Київської обл., 07400