

Броестрофан®
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий безбарвний розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину (мг):

клопростенолу натрієва сіль - 0,25.

Допоміжні речовини: натрію цитрат, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

Клопростенол – синтетичний аналог простагландину Ф2 альфа, який в період лютеальної фази статевого циклу у самок викликає регресію жовтого тіла та сприяє росту і розвитку фолікулів.

Застосування

Коровам, нетелям, телицям для посилення потуг при ускладнених родах, прискорення інволюції матки, затриманні посліду, терапії ендометритів у комбінації з протимікробними засобами, регресії персистентного жовтого тіла, регресії кісти жовтого тіла, стимуляції і синхронізації еструсу в період осіменіння.

Свиноматкам для стимуляції родів та синхронізації опоросів.

Кобилам для стимуляції еструсу та регресії персистентного жовтого тіла.

Сукам, кішкам для комплексної терапії хронічних ендометритів та переривання небажаної вагітності.

Дозування

Броестрофан® вводиться внутрішньом'язово або підшкірно.

Корови, нетелі, телиці:

– при родових ускладненнях – 2 мл на 400 кг маси тіла. На кожні 50 кг більшої (меншої) ваги доза збільшується (зменшується) на 0,3 мл;

– при функціональному розладі яєчників – 2 мл за 3 - 3,5 доби до бажаного терміну осіменіння.

При відсутності ознак тічки, повторне введення препарату проводиться на одинадцятий день після першої ін'єкції. Через 3 - 3,5 доби, незалежно від ознак тічки, проводиться дворазове осіменіння.

Вівцематки, свиноматки – 0,5-0,7 мл.

Кобили – 1 мл. Найбільш сприятливий термін для спарювання настає на 4-6 добу після введення.

Сукам – 0,2-0,3 мл.

Кішкам – 0,1 мл, для викликання абортів необхідно 3-5 таких ін'єкцій з інтервалом 12 годин.

Протипоказання

При введенні самкам в першій третині вагітності існує висока вірогідність абортів.

Застереження

При передозуванні може проявитися діарея, блювота, неспокій, гіперсалівація.

Форма випуску

Скляні ампули по 2 мл, скляні або поліетиленові ампули по 5 мл, скляні флакони по 10, 20 мл.

Зберігання

Суше, темне місце при температурі від 5 до 20°C.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника
ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18 а, м. Бровари, Київська обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1