

29.10.2018

### Коротка характеристика продукту

1. Назва

ЦЕДА-віт

2. Склад

1 мл кормової добавки містить діючі речовини:

вітамін А	50000±10 % МО;
вітамін D <sub>3</sub>	5000±10 % МО;
вітамін Е	50±10 % мг;
вітамін С	100±5 % мг.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт, бутилгідрокситолуол, сорбітол, натрію гідроксид, натрію метабісульфіт, натрію бікарбонат, динатрію едетат, полісорбат-80, вода високоочищена.

3. Фармацевтична (лікарська) форма

Емульсія.

4. Фармакологічна дія

ЦЕДА-віт — це комбінована кормова добавка, в якій вітаміни А, D<sub>3</sub>, Е та С представлені у фізіологічно обґрунтованих співвідношеннях. Їх комбінація забезпечує комплексну дію на організм тварин, яка виражається в нормалізації обміну речовин, профілактиці гіпо- і авітамінозів та ускладнень, що розвиваються на їх фоні.

Вітамін А приймає участь в окисно-відновних реакціях. Гальмуючи активність інсуліну, він впливає на вуглеводний і жировий обміни; активізує метаболізм кальцію і магнію, входить до складу ліпідного шару клітинних мембран.

Вітамін D<sub>3</sub> відіграє провідну роль в обміні кальцію і фосфору, починаючи з моменту всмоктування з кишечника, закінчуючи виведенням із організму тварин, впливає на формування та розвиток скелету.

Вітамін Е, як антиоксидант, запобігає окисненню жирних кислот, забезпечує стійкість і активність епітелію слизових оболонок статевої системи, травного каналу і кон'юнктиви.

Спільно вітаміни А, D<sub>3</sub> та Е підвищують загальну резистентність організму тварин, покращують їх стан, попереджують виникнення рахіту й остеомалаяції.

Вітамін С — потужний антиоксидант, що відіграє значну роль у регуляції окиснювально-відновних процесів, активує синтез колагену і проколагену, стероїдних гормонів і катехоламінів, обмін фолієвої кислоти та заліза. Регулює процес згортання крові, нормалізує проникність капілярів, необхідний для кровотворення, забезпечує протизапальну і протиалергічну дію.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози, собаки, коти, хутрові звірі, кролі, птиця (кури, індики, гуси, качки).

5.2 Показання до застосування

Кормову добавку згодують тваринам і птиці у періоди підвищеної потреби в поживних речовинах, особливо високопродуктивним тваринам у стресових ситуаціях, при зниженні продуктивності, транспортуванні, проведенні ветеринарних заходів, зміні складу корму, високих температурах, лактуючим і вагітним тваринам (лише у другій половині вагітності), особливо при порушеннях репродуктивної функції, у комбінованій терапії при інфекційних та інвазійних захворюваннях, зменшенні несучості, погіршенні заплідненості інкубаційних яєць та зниженні міцності їх шкаралупи.

ЦЕДА-віт попереджує виникнення у тварин і птахів рахіту, остеомалаяції, підвищує плодючість самок та життєздатність молодняку. Використовують як допоміжний засіб для підвищення стійкості організму проти дії різних токсинів і для активізації імунологічних реакцій.

29.10.2018

### 5.3 Протипоказання

Даних немає.

### 5.4 Особливі застереження при використанні

Перед застосуванням вміст флакону необхідно збовтати.

### 5.5 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Без особливостей.

### 5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Даних немає.

### 5.7 Способи введення і кількість для тварин різного віку

Перорально, змішуючи з кормом або додаючи у питну воду один раз у 3-4 тижні із розрахунку (мл/на 10 кг маси тіла):

велика рогата худоба, коні	0,3-0,5;
телята, лошата	0,4-0,5;
вівці, кози	0,5-1,0;
свиноматки	0,3-0,7;
поросята	1,0-1,5;
собаки, коти	0,3-0,6;
хутрові звірі, кролі	1,0-1,5.

Одноразову кількість кормової добавки краще розділити на три частини і згодовувати тваринам впродовж трьох діб підряд.

Птиці випоюють кормову добавку, зазвичай, із питною водою або згодовують із кормом тричотири добовим курсом щомісячно із розрахунку (мл на 100 л питної води або на 100 кг корму):

кури-несучки та молодки	30,0-50,0;
курчата	25,0-30,0;
індики, гуси	60,0-70,0;
індичата, гусенята	35,0-40,0;
качки	25,0-50,0;
каченята	20,0-35,0.

За необхідності кількість кормової добавки можна збільшувати в 2-3 рази.

При розведенні ЦЕДА-віт, помішуючи, додають до води, а не навпаки.

Перед застосуванням вміст флакону необхідно збовтати.

### 5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Даних немає.

### 5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При розведенні ЦЕДА-віт, помішуючи, додають до води, а не навпаки.

## 6. Фармацевтичні особливості

### 6.1 Термін придатності

12 місяців.

### 6.2 Особливі заходи зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5 до 25 °С.

### 6.3 Природа і склад контейнера первинного пакування

Флакони зі скла або полімерних матеріалів, об'ємом 10, 50, 100, 200 і 1000 мл та полімерні каністри, об'ємом 3 і 5 л.

### 6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним продуктом або із його залишками

Невикористаний продукт або його залишки утилізують згідно із чинними вимогами.

## 7. Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

29.10.2018

**8. Назва і місцезнаходження виробника**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

**9. Додаткова інформація**