

Рафензол
(емульсія для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Емульсія білого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

рафоксанід - 110 мг,

фенбендазол - 75 мг.

Допоміжні речовини: тилоза, тівн-80, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC30, комбінації бензімідазолів і споріднених речовин)

Рафензол – антигельмінтний препарат широкого спектру дії, до складу якого входять дві діючі речовини: рафоксанід і фенбендазол. Механізм дії рафоксаніду пов'язаний з порушенням енергетичного обміну гельмінтів і у здатності роз'єднувати окислювальне фосфорилювання. Фенбендазол інгібує ферментну систему гельмінтів, що також призводить до порушення енергетичного обміну та спричиняє загибель паразитів.

Рафензол ефективний проти статевозрілих трематод родини *Paramphistomatidae* та молодих форм (від 6-тижнів і старше). Антигельмінтик діє згубно на статевозрілі трематоди виду *Dicrocoelium lanceatum*, *Fasciola hepatica*; шлуково-кишкові і легеневі нематоди виду *Haemonchus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Nematodirus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Ostertagia spp.*, *Strongyloides spp.*, *Trichuris spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Dictyocaulidae spp.*, тощо; цестоди виду *Moniezia expansa*, *M. benedebia*, *Avitellina centripunctata*, *Thysaniezia giardia* та личинок порожнинного овода *Oestrus ovis*.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець і кіз за трематодозів (парамфістоматидози, дикроцеліоз, фасціольоз), нематодозів кишкового каналу і легень, цестодозів та хіміотерапія проти личинок овечого овода.

Дозування

Дегельмінтизацію проводять одноразово до початку вранішньої годівлі. Препарат вводять внутрішньо з теплою водою (25-30 °С) за допомогою пляшки або у суміші з 1,5-2 кг зволоженого комбікорму у дозах:

Велика рогата худоба:

дикроцеліоз, фасціольоз – 0,75 мл / 10 кг маси тіла,

парамфістоматидози – 1 мл / 10 кг маси тіла.

Вівці, кози:

асоціативні гельмінтози (мікстінвазії) та естроз – 0,75 мл / 10 кг маси тіла.

Протипоказання

Не застосовувати глибокотільним та щойно розтеленим коровам!

Не застосовувати тваринам з клінічними ознаками розладу органів травлення (атонія передшлунків, тимпанія)!

Не застосовувати одночасно з бромсаланфлукіцидами!

Застереження

Перед масовою дегельмінтизацією кожен серію препарату Рафензол попередньо випробовують на кількох тваринах, за якими спостерігають протягом доби.

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 28 діб, а споживання молока в їжу людям через – 7 діб після застосування препарату.

Форма випуску

Флакони з оранжевого скла або полімерних матеріалів по 50, 100, 500 та 1 000 мл

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1

25.07.2017

Зберігання

Сухе темне місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари, Київська обл., 07400

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари, Київська обл., 07400