

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Біофел PCHR, Biofel PCHR – вакцина інактивована проти панлейкопенії, каліцивірозу, герпесвірусної інфекції та сказу котів.

Склад

Одна доза (1 мл) вакцини містить:

Активнодіючі речовини:

Вірус панлейкопенії (FPV), штам FPV-Bio 7

– RP ≥ 1

Каліцивірус (FCV), штам FCV-Bio 8

– RP ≥ 1

Герпесвірусна інфекція (FHV-1), штам FHV-1-Bio 9

– RP ≥ 1

Вірус сказу, штам Vnukovo-32-Bio 8

– 1-4 MO

Допоміжні речовини:

Тіомерсал як консервант

– 0,01 %

Масляний ад'юvant

– до 1 мл

Фармацевтична форма

Емульсія.

Імунобіологічні властивості

Після потрапляння в організм вакцинованої тварини антигени, що містяться у вакцині, розпізнаються як сторонні елементи, і в організмі активується ряд захисних механізмів (макрофаги, опсоніни, інтерлейкіни, β -лімфоцити тощо), внаслідок чого починають формуватися антитіла, специфічні проти антигенних детермінант, що містяться у вакцині. Вказані механізми повинні захищати від наступного розвитку інфекції після зараження.

У вакцинованої тварини формується стійкий імунітет через 2-4 тижня після ревакцинації і триває протягом 1 року. Тварин, які були вакциновані, ревакцинують з інтервалом 3-4 тижні. Для підтримання імунітету рекомендується щорічна ревакцинація.

Вид тварин

Коти.

Показання до застосування

Для активної вакцинації котів проти панлейкопенії, каліцивірозу, герпесвірусної інфекції та сказу, починаючи з 3-місячного віку.

Протипоказання

Загальні гіпертермічні захворювання.

Застереження при застосуванні

Перед застосуванням добре струсити вміст флакону і підігріти до кімнатної температури (15-25)°C. Вакцинувати можна лише клінічно здорових тварин з хорошим ступенем вгодованості. Дегельмінтизацію проводити мінімум за 10 днів до вакцинації.

Взаємодія з іншими засобами

Не застосовувати з іншими ветеринарними препаратами.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Не застосовувати вакцину в другій половині вагітності для того, щоб захистити самицю та плід від неприємних маніпуляцій.

Спосіб застосування та дози

Вакцину вводять підшкірно (в область за лопатками) у дозі 1 мл незалежно від віку, маси та породи тварин.

Схема вакцинації:

Основна вакцинація. Тварин щеплюють у віці 8-10 тижнів вакциною Біофел PCH.

Перша ревакцинація. Ревакцинація тварин, через 3-4 тижні після основної вакцинації, вакциною Біофел PCHR у дозі 1 мл, починаючи з 3-місячного віку.

Друга ревакцинація. Для підтримання імунітету рекомендується щорічна ревакцинація одноразовим щепленням вакциною Біофел РСНР.

У вакцинованої тварини формується стійкий імунітет через 2-4 тижні після ревакцинації і триває протягом 1 року.

Побічні ефекти

У місці застосування вакцини можуть з'явитися місцеві реакції (розміром з горошину), які зникають самі по собі протягом 3 тижнів. У рідких випадках можуть спостерігатися алергічні реакції.

Період виведення (каренції)

Не призначено для продуктивних тварин.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВПП

Дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

Уникати аутовакцинації. У разі випадкового введення вакцини необхідно терміново звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути утилізовані шляхом кип'ятіння впродовж 30 хвилин.

Термін придатності

2 роки. Вакцину з відкритого флакону використати впродовж 8 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати!

Упаковка

Вакцина випускається у скляних флаконах, що закриті гумовим корком та запаяні алюмінієвою кришкою. Флакони з вакциною вміщені в пластикові коробки з лунками або картонні коробки. Кожна пластикова коробка вкрита пластиковою кришкою. У кожній коробці міститься затверджена листівка-вкладка.

Пластикова коробка з 10 лунками: 2 x 1 мл, 10 x 1 мл, 5 x 5 мл, 10 x 5 мл.

Пластикова коробка з 20 лунками: 20 x 1 мл.

Пластикова коробка з 100 лунками: 100 x 1 мл.

Картонна коробка: 1 x 5 мл.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Акціонерне товариство «Біовета», Коменського 212, 683 23 Івановіце на Гане, Чеська Республіка.

Правила відпуску

За рецептром.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникили ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламицій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.