

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Біокан Новел DHPPi, Biocan Novel DHPPi – вакцина жива проти чуми м'ясоїдних, аденовірозу, парвовірозу та парагрипу собак

Склад

Одна доза (1 мл) вакцини містить:

а) Ліофілізований компонент:

| | |
|---|---|
| вірус чуми м'ясоїдних, штам CDV Bio 11/A | – $10^{3,1}$ ТЦІД ₅₀ – $10^{5,1}$ ТЦІД ₅₀ |
| аденовірус тип 2, штам CAV-2 Bio 13 | – $10^{3,6}$ ТЦІД ₅₀ – $10^{5,3}$ ТЦІД ₅₀ |
| парвовірус, штам CPV-2b Bio 12/B | – $10^{4,3}$ ТЦІД ₅₀ – $10^{6,6}$ ТЦІД ₅₀ |
| вірус парагрипу тип 2, штам CPiV-2 Bio 15 | – $10^{3,1}$ ТЦІД ₅₀ – $10^{5,1}$ ТЦІД ₅₀ |

б) Розчинник:

вода для ін'єкцій – 1 мл

Допоміжні речовини:

живильне середовище для ліофілізації – 0,3 мл

Фармацевтична форма

Ліофілізат і розчинник.

Імунобіологічні властивості

Вакцина формує активний імунітет проти вірусу чуми м'ясоїдних, парвовірусу типу 2a, 2b, 2c, аденовірусу типів 1 і 2 та вірусом парагрипу. Імунітет розвивається через 3 тижні після базової вакцинації проти вірусу чуми м'ясоїдних, аденовірусу, парвовірусу та вірусу парагрипу. Імунітет триває щонайменше один рік після проведення базового курсу вакцинації проти вірусу парагрипу та до трьох років після проведення базового курсу вакцинації проти вірусу чуми м'ясоїдних, аденовірусу, парвовірусу.

Вид тварин

Собаки.

Показання до застосування

Для активної вакцинації собак віком від 6 тижнів проти хвороб, викликаних вірусом чуми м'ясоїдних, аденовірусом типів 1 і 2, парвовірусом типу типу 2a, 2b, 2c та вірусом парагрипу.

Протипоказання

Загальні гіпертермічні захворювання.

Застереження при застосуванні

Хороша імунна реакція залежить від повністю здорової імунної системи. Імунокомпетентність у тварин може погіршуватися різноманітними чинниками, включаючи поганий стан здоров'я, статус харчування, генетичні чинники, супутнє лікування та стрес.

Вакцинувати можна лише клінічно здорових тварин.

Взаємодія з іншими засобами

Рішення про застосування цієї вакцини перед чи після введення будь-якого іншого ветеринарного лікарського засобу має прийматися індивідуально у кожному окремому випадку.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Не застосовувати тваринам під час вагітності або лактації.

Спосіб застосування та дози

1 мл незалежно від маси та породи тварини.

Метод застосування: підшкірно в область під лопатками.

Рекомендована схема вакцинації:

Базова вакцинація: Ввести одну дозу вакцини Біокан Новел DHPPi у віці від 6 тижнів та ввести другу дозу через 3-4 тижні після першої вакцинації.

Ревакцинація: Одна доза вакцини Біокан Новел DHPPi вводиться щорічно.

Побічні ефекти

У місці застосування можливе виникнення тимчасового набряку, що іноді може почервоніти, бути болючим або теплим. Подібний набряк або розсмоктується, або значно зменшується протягом 14 днів після вакцинації.

Період виведення (каренції)

Не призначено для продуктивних тварин.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

У разі випадкової аутовакцинації слід негайно звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний ветеринарний лікарський засіб або його відходи такого ветеринарного лікарського засобу повинні бути утилізовані відповідно до вимог місцевого чинного законодавства.

Термін придатності

2 роки. Розчинену вакцину використати одразу.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморозувати!

Упаковка

Вакцина випускається у скляних флаконах, що закриті гумовою пробкою та запаяні алюмінієвими кришками. Флакони з вакциною та флакони з розчинником поміщені в прозорі пластикові коробки. У кожній коробці міститься затверджена листівка-вкладка.

Розмір упаковки:

Пластикові коробки з 20 лунками: 10x1 мл вакцини + 10x1 мл розчинника.

Пластикові коробки з 50 лунками: 25x1 мл вакцини + 25x1 мл розчинника.

Пластикові коробки з 100 лунками: 50x1 мл вакцини + 50x1 мл розчинника.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Акціонерне товариство «Біовета», Коменського 212, 683 23, Івановіце на Гане, Чеська Республіка.

Правила відпуску

Без рецепта.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.