

Коротка характеристика продукту

1. Назва

Діа ДОГ & кет

2. Склад

Овочевий субпродукт, цукор, м'ясний субпродукт, мінеральні поживні речовини, молоко і молочні продукти, риба і рибні субпродукти, яйця і яєчні продукти.

Аналітичний склад:

Білок – 22,3 %;
Жир – 4,4 %;
Клітковина – 7,2 %;
Зола – 12,2 %;
Зола, нерозчинна в HCl – 6,6 %;
Натрій – 1,2 %;
Калій – 0,6 %.

Допоміжні речовини на 1 кг:

Бентоніт-монтморилоніт – 40,0 мг.

3. Фармацевтична (лікарська) форма

Таблетки для жування.

4. Фармакологічна дія.

Кормова добавка містить збалансовану суміш інгредієнтів природного походження для пом'якшення гострого порушення всмоктування у кишечнику (діареї). Значне гелеутворення у травному каналі сприяє виведенню грудок шерсті (трихобезоар) у котів.

Кормова добавка має високий електролітний склад, легкозасвоювані поживні речовини, глюкозу.

5. Клінічні особливості:

5.1 Вид тварин

Собаки та коти.

5.2 Показання до застосування

Для усунення гострих розладів кишкової абсорбції (діареї) та сприянню виведення трихобезоар з травного каналу у котів і собак.

5.3 Протипоказання

Відсутні.

5.4 Особливі застереження при використанні

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря ветеринарної медицини.

5.5 Використання під час вагітності, лактації

Без обмеження.

5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Без обмеження.

5.7 Дози і способи введення тваринам різного віку

Собаки

Таблетку змішують з кормом або задають тварині безпосередньо у дозі (на 1 тварину):

тварини масою тіла до 10 кг – по ½ таблетки двічі на добу;

тварини масою тіла до 20 кг – по 1 таблетці двічі на добу;

тварини масою тіла понад 20 кг – по 1 таблетці тричі на добу.

Коти

таблетку змішують з кормом, задають тварині безпосередньо або подрібнюють чи розчиняють у воді та дають примусово за допомогою шприца у дозі (на 1 тварину):

тварини масою тіла до 3 кг – по ½ таблетки 1 раз на добу;

тварини масою тіла понад 3 кг – по 1 таблетці 1 раз на добу.

Протягом прийому кормової добавки тварина може пити воду в будь-який час.

Рекомендований курс застосування: 5 діб або згідно з рекомендаціями лікаря ветеринарної медицини.

Якщо одужання не настає через 2 доби, необхідна консультація з лікарем ветеринарної медицини.

5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Інформація відсутня.

5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Відсутні.

6. Фармацевтичні особливості:

6.1 Термін придатності

36 місяців.

6.2 Особливі заходи зберігання

Зберігати в сухому темному, недоступному для дітей місці при температурі від 15 до 25 °С.

6.3 Природа і склад контейнера первинного пакування

1 таблетка по 5 г у саше, по 60 таблеток в картонній пачці.

6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним продуктом або із його залишками

Невикористану кормову добавку утилізують згідно з чинними вимогами.

7. Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ПАТ “Київмедпрепарат” (Україна)

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139

8. Назва і місцезнаходження виробника

Сапплексан ГмбХ енд Ко. Кг (Німеччина)

Мароммерштрассе, 21, 22850, Нордерштедт,
Гамбург

Supplexan GmbH & Co. Kg (Germany)
Marommerstraße, 21, 22850, Norderstedt,
Hamburg,

9. Додаткова інформація