



ukrzoovet.com.ua

Регистрационное свидетельство  
№ АВ -01193-01-10

## ГЛЮКОЗЫ 40% РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

листок-вкладыш

### Описание

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.

### Состав

100 мл препарата содержат действующее вещество: глюкозу (в пересчете на безводную) - 40,0 г.

Вспомогательные вещества: кислота соляная, натрия хлорид, вода высокоочищенная.

### Фармакологические свойства

**АТС-vet классификационный код: QВ05СХ01 Другие растворы для ирригации. Глюкоза.**

Препарат повышает осмотическое давление плазмы крови, увеличивает поток жидкости, а вместе с ней и количество продуктов распада и токсинов из тканей, ускоряет обмен веществ, усиливает диурез, улучшает работу сердца, расширяет сосуды. Умеренно раздражая интеррецепторы сосудов и других тканей, глюкоза непосредственно и рефлекторно, через центральную нервную систему, усиливает функции клеток и тканей, проявляет антитоксическое влияние, тонизирует вегетативную иннервацию, повышает защитные силы организма, стимулирует синтез гормонов и ферментов.

### Применение

Для лечения животных при острых инфекциях, кровепаразитарных заболеваниях, хронической сердечно-сосудистой недостаточности, падении кровяного давления. Глюкоза входит в состав протившоковых и кровезамещающих жидкостей, применяемых при шоковом состоянии, коллапсе, больших потерях крови. Раствор глюкозы 40% применяют при токсикоинфекциях, отравлениях, отеке и гангрене легких, заболеваниях печени (гепатитах, циррозе), недостаточном диурезе. Назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с явлениями интоксикации и судорогах мышц, ацетонемии, послеродовой гемоглобинурии у коров, кетонурии и токсемии молочных коров, кетонурии овец. Как кровоостанавливающее средство применяют препарат при желудочно-кишечных, легочных и других внутренних кровотечениях, геморрагическом диатезе. Раствор глюкозы вводят ослабленным и истощенным животным как энергетическое и диетическое средство.

Применяют при расстройствах функции центральной нервной системы (угнетении и возбуждении), нарушении вегетативной иннервации, различных формах сердечной недостаточности, заболеваниях печени, слабой сократительной способности матки, родильном парезе, интоксикациях.

### Дозировка

Препарат применяют внутривенно, подкожно 1-2 раза в сутки в дозах (на одно животное, мл):

крупный рогатый скот	30-150
лошади	30-120
свиньи, овцы, козы	10-30
собаки	5-10
пушные звери	1-5

### Противопоказания

Гипергликемия.

### Предостережение

Нет.

### Форма выпуска

Стеклообразные флаконы, бутылки, объемом 100 и 200 мл.

### Хранение

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 0 до 25°C.

Срок годности - 2 года.

### Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромстач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua