

04.03.2026

Карбовет (гель очний)
(гель очний)
листівка-вкладка

Опис

Гель безбарвний прозорий.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

карбомер — 2 мг.

Допоміжні речовини: цетримід, натрію гідроксид, сорбіт, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

ATCvet класифікаційний код: QS01- Офтальмологічні препарати (QS01XA20 — Штучна сльоза та інші індиферентні препарати).

Препарат Карбовет (гель очний) – це стерильний сльозозамінник для собак та котів, створений на основі високомолекулярного гідрофільного полімеру акрилової кислоти. Його рН та осмоляльність наближені до показників природної слізної плівки, що забезпечує добру місцеву переносимість.

Діюча речовина препарату карбомер не вступає у фармакологічну взаємодію з тканинами ока, а забезпечує тривале зволоження, змащування та захист очної поверхні, що є основою терапії синдрому «сухого ока». Гель формує на поверхні рогівки та кон'юнктиви прозору зволожувальну плівку, яка діє як фізичний бар'єр, захищаючи епітелій від висихання та механічного подразнення.

Застосування

Застосовують собакам та котам для замісної терапії при зниженій секреції слізної рідини, лікування синдрому «сухого ока» та для симптоматичного лікування сухого кератокон'юнктивіту.

Дозування

Використовують по 1 краплі в кон'юнктивальний мішок 3–5 разів на добу або частіше. Частоту застосування та курс лікування визначає лікар ветеринарної медицини залежно від стану тварини.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

Застереження

Побічна дія

Одразу після введення препарату можлива тимчасова нечіткість зору. У поодиноких випадках можуть спостерігатися реакції підвищеної чутливості до компонентів препарату, зокрема, біль в очах. Консервант цетримід іноді спричиняє подразнення очей, що може супроводжуватися печінням, почервонінням чи відчуттям стороннього тіла.

Особливі застереження при використанні

Не допускайте контакту кінчика крапельниці з оком чи будь-якою поверхнею, щоб уникнути забруднення вмісту туби.

Використання під час вагітності та лактації

Безпека застосування під час вагітності та лактації не встановлена. Використовувати лише за призначенням і під контролем лікаря ветеринарної медицини.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Застосування препарату може продовжувати дію інших очних засобів. Інтервал між закапуванням інших очних крапель та нанесенням гелю має становити не менше 5 хвилин, при використанні мазей — не менше 15 хвилин. Препарат Карбовет завжди застосовують останнім.

Передозування

При місцевому застосуванні передозування малоймовірне.

04.03.2026

Період виведення (каренції)

Для непродуктивних тварин не визначають.

Форма випуску

Туби з полімерних матеріалів по 20 г.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 15 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Після відкриття туби препарат використати впродовж 6 тижнів.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту:

ТОВ «БРОВАФАРМА»

б-р Незалежності, 18-а

м. Бровари, Київська обл.

07400, Україна