

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
Н.А. Власов
8 9 ИЮН 2011

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп-Интим капль (Стоп-Интим капли 2, Стоп-Интим капли 3) в целях регуляции половой охоты у кошек и собак

(организация-производитель ООО НПО «Апи-Сан», Московская область)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп-Интим капли (Стоп-Интим капли 2, Стоп-Интим капли 3) [Stop-Intim drops (Stop-Intim drops 2, Stop-Intim drops 3)].

Международное непатентованное наименование: мегестрола ацетат.

2. Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

Стоп-Интим капли в качестве действующего вещества содержит мегестрола ацетат. Выпускают препарат в двух дозировках: «Стоп-Интим капли 2» с содержанием мегестрола ацетата - 20 мг/мл, и «Стоп-Интим капли 3» с содержанием мегестрола ацетата - 30 мг/мл. В качестве вспомогательных компонентов препарат содержит натрия бензоат (консервант) – 0,5 мг/мл и рафинированное растительное масло (подсолнечное или оливковое) – до 1 мл.

3. Препарат выпускают в полиэтиленовых или стеклянных флаконах с пробкой-капельницей и навинчиваемой пластмассовой крышечкой, упакованные в картонные пачки.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Хранят Стоп-Интим капли в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 2⁰С до 25⁰С.

5. Стоп-Интим капли следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата не требуется.

II. Фармакологические свойства

7. Стоп-Интим капли относится к гормональным лекарственным препаратам.

Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой синтетическое производное гормона прогестагена и обладает свойством ингибировать секрецию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормона, которые вырабатываются передней долей гипофиза. При использовании препарата до начала эструса (течки) происходит угнетение синтеза эстрогенов фолликулами яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических изменений у самок, связанных с половым циклом, при недостаточном количестве ЛГ, процесс овуляции становится невозможным.

При применении препарата самкам на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки.

У самцов мегестрол ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней

поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость у животного.

Мегестрол ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и выводится из организма в виде солей с мочой в течение 1-2 суток.

Стоп-Интим по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают гепатотоксического, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Стоп-Интим капли назначают для регуляции половой охоты у кошек и собак, в том числе для задержки и прерывания течки у самок кошек и сук, снижения половой активности и коррекция поведения у котов и кобелей.

9. Противопоказанием к применению Стоп-Интим капель является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет. Не следует применять препарат неполовозрелым животным, беременным и лактирующим самкам.

10. Стоп-Интим капли применяют животным индивидуально за 1-2 часа до кормления, капая с помощью капельницы на корень языка или на кусочек лакомства. Перед применением флакон с суспензией следует тщательно взболтать в течение 1-2 минут.

Доза препарата зависит от вида, пола, массы животного и цели применения.

Кошкам применяют препарат «Стоп-Интим капли 2»:

- с целью задержки течки - в период между течками один раз в неделю в дозе 4 капли на животное. Курс применения препарата – не более 18 месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического цикла.

- с целью прерывания течки - при появлении первых признаков течки (но не позднее чем через 3 дня от ее начала) 5-7 раз с интервалом 24 часа в дозе 9 капель на животное.

Сукам применяют препарат «Стоп-Интим капли 3»:

- с целью задержки течки за 7-15 дней до начала течки в дозе 3 капли на 5 кг массы животного ежедневно. Курс применения – не более 32 дней. В течение года следует проводить не более двух курсов применения лекарственного препарата.

- с целью прерывания течки - при появлении первых признаков течки (и не позднее чем через 3 дня от ее начала) в суточной дозе 12 капель на 5 кг массы животного. Первые три дня препарат применяют в суточной дозе, последующие 7 дней – по 1/2 суточной дозы. В течение года следует проводить не более двух курсов применения лекарственного препарата.

Самцам для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат применяют в следующих суточных дозах:

- котам 8 капель «Стоп-Интим капли 2» на животное;

- кобелям 12 капель «Стоп-Интима капли 3» на 5 кг массы животного.

Первые 7 дней лекарственный препарат применяют в суточной дозе, последующие 14 дней по 1/2 суточной дозы.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. При первом применении лекарственного препарата у животного могут наблюдаться гиперсаливация и повышенный аппетит.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или при

его длительном применении возможны обильное слюнотечение, раздражение кожи, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы. В этих случаях применение препарата следует прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства.

15. Стоп-Интим капли совместимы с другими лекарственными препаратами, кормами и кормовыми добавками. Не рекомендуется совместное длительное применение Стоп-Интим капель с кортикостероидами.

16. Сроки использования продукции животноводства после применения Стоп-Интима не регламентируются.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе со Стоп-Интим каплями следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время применения препарата запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует тщательно вымыть руки с мылом.

18. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей проточной воды.

19. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей.

20. Организация-производитель: ООО НПО «АПИ-САН», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, пос. Новый Милет, владение 4.

Инструкция разработана ООО «АПИ-САН»; Россия, 117437, Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222.

С вступлением в силу настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утверждённая Россельхознадзором 30 июня 2006 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».