

01.06.2016

Тераміцин Аерозоль Спрей
(спрей для зовнішнього застосування, розчин)
листівка-вкладка

Опис

Розчин синього кольору.

Склад

150 мл препарату містить діючу речовину:

окситетрацикліну гідрохлорид - 4 г.

Допоміжні речовини: патентований голубий, полісорбат 80, спирт ізопропіловий, n-бутан.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QD06 - антибіотики та хімотерапевтичні препарати для місцевого застосування. QD06AA03 - Окситетрациклін.

Окситетрациклін – це антибіотик із бактеріостатичною дією, який інгібує синтез білка в чутливих бактерій. У середині клітини окситетрациклін зв'язує рецептори на 30S субодиницях бактеріальної рибосоми, що перешкоджає зв'язуванню аміноацилтрансферази РНК на акцепторній стороні РНК-рибосомного комплексу, що перешкоджає транспортуванню амінокислот для подовження пептидного ланцюга, чим зупиняє синтез білка. Діє на такі мікроорганізми як: *Escherichia coli*, *Salmonella choleraesuis*, *Pasteurella multocida*, *Leptospira pomota*, *Bacillus polymyxa*, *Pseudomonas aeruginosa*.

При зовнішньому застосуванні всмоктування окситетрацикліну є дуже незначним, він вступає в прямий контакт з бактеріями на шкірі та на ушкоджених зовнішніх ділянках тіла тварини. Маркерний барвник показує площу обробленої ділянки.

Застосування

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, котів, собак та кролів, хворих на пальцевий дерматит, копитну гниль, а також при шкірних хворобах, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до окситетрацикліну. Використовується як допоміжний засіб при лікуванні тварин, хворих на коросту.

Дозування

Зовнішньо. Перед застосуванням пошкоджена ділянка копит або шкіри повинна бути очищеною. Перед застосуванням флакон із препаратом ретельно струшують. Пошкоджену ділянку обробляють препаратом протягом 2-3 секунд із відстані 15-20 см. У разі потреби лікування повторюють 1 раз на тиждень.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окситетрацикліну.

Застереження

При застосуванні препарату дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами, а саме: не допускати попадання в очі, уникати попадання на шкіру, уникати вдихання парів, мити руки після використання, не використовувати спрей біля відкритих вогнищ чи інших розжарених речовин. Вогнєнебезпечний. Повинен застосовуватися в добре провітрюваних приміщеннях. Не курити під час використання препарату.

Форма випуску

Герметичні лаковані алюмінієві флакони по 150 мл.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15 °С до 25 °С.

Захищати від прямих сонячних променів та не зберігати при температурі понад 50 °С.

Термін придатності – 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

0 1. 0 6. 2016

Зоетіс Інк.,
100 Кампус Драйв,
Флорхем Парк, Нью Джерсі 07932, США

Виробник готового продукту:

АйДжіЕс Аерозолс ГмбХ
Ім Хеммет 1,
Ді – 79664 Вехр / Баден,
Німеччина

Zoetis Inc.,
100 Campus Drive,
Florham Park, New Jersey 07932, USA

IGS Aerosols GmbH
Im Hemmet 1
D – 79664 Wehr / Baden
Germany