

Йодофоам ендофоам
(розчин для внутрішньоматкового застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин червоно-коричневого кольору з характерним запахом йоду.

Склад

1 балон (45,2 г) містить діючі речовини:

йод - 0,2 г,

калію йодид - 0,4 г.

Допоміжні речовини : цетостеариловий спирт, лаурилсульфат натрію, пропіленгліколь, пропан-бутан газ.

Фармакологічні властивості

Йод має широкий спектр антимікробної дії. Його вплив пов'язаний з тривалим виділенням молекулярного йоду. Механізм антимікробної дії полягає в порушенні обмінних процесів збудників. Проникаючи в протоплазму клітин, йод взаємодіє з аміногрупами білків, пригнічує діяльність життєво важливих ферментних систем мікроорганізмів. При взаємодії йоду з водою протоплазми клітин утворюється активний кисень (сильний окиснювач).

Калію йодид сприяє розчиненню йоду та запобігає утворенню йодидної кислоти та її солей. Калію йодид має бактерицидну та протизапальну дії, впливає на обмін речовин, сприяє розсмоктуванню продуктів запалення і регенерації тканин.

З утворенням піни з'являється можливість впливу активної речовини на всю внутрішню поверхню стінки матки та її рогів.

Застосування

Лікування корів, хворих на підгострі та хронічні форми ендометритів, піометри; при післяродових внутрішньоматкових інфекціях (після надання рододопомоги, кесаревого розтину, оперативного відділення посліду).

Дозування

Перед застосуванням флакон добре збовтати. Перед введенням препарату проводять санітарну обробку зовнішніх статевих органів і кореня хвоста. При необхідності звільняють порожнину матки від запального ексудату.

Препарат застосовують внутрішньоматково за допомогою одноразового катетера. Шляхом натискання на аерозольну головку, яка з'єднана з балоном, вводять вміст балону в порожнину матки протягом 10-15 секунд.

Застосовують одноразово після попереднього огляду та ректального масажу матки.

При важких формах перебігу захворювання препарат застосовують двічі або тричі з інтервалом 7 діб. У випадку піометри можна застосовувати одноразово місткість двох балончиків.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам, які мають підвищену індивідуальну чутливість до складових препарату.

Застереження

Не застосовувати під час вагітності. Після введення препарату не робити масаж матки.

Форма випуску

Аерозольні балони ємкістю 45,2 г з пластмасовим аплікатором.

Зберігання

Зберігати при температурі від 5⁰С до 25⁰С в сухому темному місці. Не підлягає заморожуванню. Уникати високих температур та вогню. Не ударяти, не відкривати, не кидати у вогонь. Зберігати закритим у недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Дуна - Кооп Лтд
2330 Дунахаразті, Зеченій, 60
Угорщина

Duna-Coop Kft
2330 Dunaharaszti, Szechenyi, 60
Hungary

Виробник готового продукту

Пернікс Фарма Лтд
8900 Залагерзег, Біро Мартон, 38
Угорщина

Pernix Pharma Kft
8900 Zalaegerszeg, Biro Marton, 38
Hungary