

Бровадазол™ таблетки
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Плоскі циліндричні таблетки від білого до сірувато-білого кольору.

Склад

1 таблетка (1 г) містить діючу речовину (мг):

фенбендазол - 50,0.

Допоміжні речовини: лактоза, кальцію карбонат, глюкоза, крохмаль, тальк, кальцію стеарат.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC13, фенбендазол)

Фенбендазол – 1-метил-5,6-(феніл-тіо)-2-бензimidазолу карбамат має високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії, знищує личинки зрілих нематод, деякі види цестод і трематод та їх яйця.

Механізм дії фенбендазолу пов'язаний з порушенням енергетичного обміну, руйнуванням мікроканальців травних клітин та появою нейротоксичного ефекту у гельмінтів. Фенбендазол згубно діє на личинки різних стадій, а також порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів. Останні при потраплянні у навколишнє середовище не спроможні до подальшого розвитку.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних та хутрових звірів, курей і гусей при ураженні їх нематодами (зрілими і незрілими формами), деякими видами цестод і трематод.

Дозування

Дози і кратність застосування препарату для дегельмінтизації різних видів тварин:

Вид тварин і назва гельмінтозу	Доза (табл./10 кг маси тіла)	
	Кількість таблеток	Кратність
Велика рогата худоба:		
диктіокаульоз, стронгілятоз і стронгілоїдоз	2	одноразово
дикроцеліоз	6,6	одноразово
цистицеркоз	5	3 доби поспіль
Дрібна рогата худоба:		
змішана нематодознаїнвазія	3	одноразово
монієзіоз	2	одноразово
трихуроз	3	2 доби поспіль
ехінококоз, ценуроз	8	3 доби поспіль
дикроцеліоз	4,4	2 доби поспіль
Свині:		
аскароз	1,5	2 доби поспіль
трихуроз	2	двічі на добу
езофагостомоз, стронгілоїдоз	2	одноразово
змішана інвазія: поросята у віці 2-8 тижнів	0,2	один раз на тижень
маточне поголів'я	1,5	двічі на добу
Коні:		
параскаридоз +стронгілятоз	3	одноразово
лошата 1-2 місяці стронгілоїдоз	1,6	2 доби поспіль

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМ'ЯТИК № -

М'ясоїдні та хутрові звірі:		
змішана інвазія	3	одноразово
Кури:		
аскаридіоз	1	2 доби поспіль
аскаридіоз + гетеракідоз	2	одноразово
Гуси:		
змішана інвазія	8	одноразово

Суміш корму з подрібненими таблетками, як правило, згодовують на початку ранкової годівлі.

Протипоказання

Бровадазол™ таблетки не можна застосовувати тваринам одночасно з протифасціольозними препаратами, а також впродовж 7 діб після лікування тварин бромсалами !

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють після останнього застосування препарату :

- велика рогата худоба, вівці, кози, свині – через 10 діб;
- птиця – через 3 доби.

Використання внутрішніх органів тварин (печінки, легень, серця) в їжу дозволяють через 20 діб.

Споживання молока людьми дозволяють через 2 доби після останнього застосування препарату.

Форма випуску

Контейнери із полімерних матеріалів, скляні флакони по 10, 30, 50, 100, 1000 табл.; блістерне пакування по 10 таблеток, по 1 або по 3 блістера в картонну коробку.

Зберігання

Сухе темне місце при температурі до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400