



Регистрационное свидетельство
№ АВ-04121-01-13

ОРНИДАЗОЛ-50
(раствор для инъекций)
листок-вкладыш

Описание

Прозрачный раствор бледно-желтого или желтого цвета.

Состав

100 мл препарата содержит действующее вещество:

орнидазол – 5 г.

Вспомогательные вещества: вода высокоочищенная, ПЭГ-400, пропиленгликоль.

Фармакологическое действие

Орнидазол - противопрозоидное и антибактериальное средство. Активен в отношении *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*; облигатных анаэробных микроорганизмов: *Bacteroides spp.* (в т.ч. *Bacteroides fragilis*, *Bacteroides distasonis*, *Bacteroides ovatus*, *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides vulgatus*), *Fusobacterium spp.*, *Veillonella spp.*, *Prevotella spp.* (*Prevotella bivia*, *Prevotella buccae*, *Prevotella disiens*), грамположительных микроорганизмов: *Eubacterium spp.*, *Clostridium spp.* К препарату не чувствительны аэробные микроорганизмы.

По механизму действия - ДНК-тропный препарат с избирательной активностью в отношении микроорганизмов, которые содержат ферментные системы, способные восстанавливать нитрогруппу и катализировать взаимодействие белков группы ферридоксина с нитросоединениями. После проникновения препарата в микробную клетку механизм его действия обусловлен восстановлением нитрогруппы под влиянием нитроредуктаз микроорганизма и активностью уже восстановленного нитроимидазола. Продукты восстановления образуют комплексы с ДНК микробной клетки, вызывая ее деградацию, нарушают процессы репликации и транскрипции ДНК. Кроме того, продукты метаболизма препарата проявляют цитотоксические свойства и нарушают процессы клеточного дыхания.

Применение

Лечение собак, больных амёбиозом, дизентерией, трихомониозом, трихомонадным уреагинитом, лямблиозом, балантидиозом, кожными инфекциями, сепсисом, менингитом, пневмонией, эндокардитом, перитонитом, абсцессом печени, эндометритом, заболеваниями костей и суставов, абсцессом легких, вызванных простейшими и микроорганизмами рода *Bacteroides*, чувствительными к орнидазолу. Для профилактики развития анаэробных инфекций после оперативных вмешательств, в том числе после операций на органах брюшной полости, окологоречном участке, гинекологических операций.

Дозировка

Подкожно или внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела животного (5 мг орнидазола на 1 кг массы тела) один раз в сутки в течение 3-5 суток.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к орнидазолу или другим производным нитроимидазола. Не применять в период беременности и лактации.

Предостережение

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у животных с заболеваниями ЦНС и заболеваниями почек.

Форма выпуска

Флаконы из стекла, закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку по 10, 50 и 100 мл.

Хранение

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 8°C до 25 ° С. Список Б.

Срок годности - 3 года.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ЛНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ЛНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua